


## BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ  
LORRAINE

DE

MYCOLOGIE



IMPRIMERIE - LIBRAIRIE - PAPETERIE

J. DORY

26, RUE SAINT-JEAN

15, RUE RAUGRAFF, NANCY



---

---

# BULLETIN

---

---

DE LA

## SOCIÉTÉ LORRAINE DE MYCOLOGIE

---

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :

FAGULTÉ DE PHARMACIE, Place Carnot, NANCY

Adresser toutes les communications à cette adresse

Pour tout ce qui concerne la publicité

S'adresser à M. DORY

24, Rue Saint-Jean, Nancy

Téléph. 23.15

---

### COMPTE RENDU

### de l'Exposition de Champignons

qui s'est déroulée du Dimanche 6 Octobre au 13 Octobre inclus

dans une dépendance de la Foire-Exposition de Metz

---

RAPPORT présenté par M. PEDRO CALAFAT

à la Société d'Histoire Naturelle de la Moselle

---

#### *Genèse de l'exposition*

Tout en étant absent de Metz, notre cher Président, M. Delafosse, se préoccupait, en raison de l'état atmosphérique, d'une exposition de champignons ; aussi avait-il tenu à la préparer dès son arrivée.

De mon côté, je voyais arriver le moment opportun de la faire, les pluies ayant été abondantes. Il ne faut pas perdre de vue qu'une exposition de champignons ne se fait pas « quand on veut », mais bien au contraire « quand on peut ». Pour qu'une telle exposition soit réussie, il faut pouvoir montrer une quantité importante d'échantillons. J'avais pressenti notre collègue, M. Emile Nicolas, de Nancy, afin de m'assurer si nous pouvions compter sur son concours et sur celui de M. le doyen Seyot. M. E. Nicolas me donna de suite son adhésion, et il m'invita à profiter d'une excursion mycologique devant avoir lieu le dimanche suivant dans les bois de Charmes, sous la conduite de M. le Professeur Seyot. L'occasion se présenterait donc de demander au dévoué président de la Société Lorraine

de Mycologie s'il voulait bien nous prêter son concours et celui de ses collaborateurs habituels.

Je me suis donc rendu à la forêt de Charmes. J'ai pressenti M. le doyen Seyot de notre intention de faire une exposition ; spontanément M. Seyot m'a assuré de son entier dévouement.

Deux idées et un but commun se sont donc rencontrés lors de ma visite à notre cher Président.

Le temps pressait. Aussi dès l'accord de principe, M. Delafosse a-t-il commencé ses démarches qui ont été couronnées de succès.

Nous étions déjà au 1<sup>er</sup> octobre.

Notre seule chance de succès était de faire l'exposition le dimanche suivant, 6 octobre.

Notre cher Président a pris aussitôt la résolution de voir M. Hocquard, président-fondateur de la Foire-Exposition.

Ce dernier n'hésite pas à nous accorder un emplacement. Il fit construire « in extremis » un local qui fut prêt à nous recevoir le dimanche à la première heure. Certes, le local ne réunissait pas les conditions propres à une exposition de champignons et il est certain qu'une critique de son aspect, de sa surface et de sa décoration ainsi que sa situation dans une « Foire-Exposition » aurait été facile. Eh bien ! malgré ce petit nuage, je suis heureux de vous dire que le résultat a dépassé toute attente.

Placer pour la première fois l'austérité de la science dans un local populaire et la présenter dans des conditions accessibles au grand public, telles étaient les appréhensions que notre cher Président avait au début.

\*  
\*\*

Un trio s'était constitué : notre cher Président, qui prenait la haute direction ; M. Delort, qui prenait la direction administrative et de propagande, et votre serviteur, à qui fut confié la direction technique.

A souligner le concours empressé des agents forestiers de la région de Thionville, de M. et M<sup>me</sup> Broyer, et à nouveau de M. Delort qui s'est dépensé sans compter pour l'apport des champignons à exposer.

A l'ouverture de l'exposition, le dimanche, à midi, nous pouvions présenter plus de 150 espèces cueillies dans la région. C'est vous dire que la chance nous a favorisés.

Le classement de ces 150 espèces a été fait par M. le doyen Seyot, assisté de MM. Emile Nicolas, Leblanc, André Nicolas, Delort, etc.

M. le Maire de Metz, à titre officieux et en tant que membre de notre Société, nous a honorés en assistant à l'ouverture de notre exposition, et a bien voulu permettre la prise du cliché ci-contre.

Même avant que la classification des espèces exposées soit ter-

minée, le défilé du public commença et il s'est poursuivi sans interruption. La circulation du public se faisait dans le sens giratoire afin de suivre le classement qui était le suivant :



Au premier rang et de gauche à droite : MM. Vautrin, maire de Metz ; Seyot, président de la Société Lorraine de Mycologie ; Hocquard, président-fondateur de la Foire-Exposition de Metz ; Delafosse, président de la Société d'Histoire Naturelle de la Moselle ; au deuxième rang, derrière M. Vautrin, M. Leblanc, trésorier de la Société Lorraine de Mycologie ; derrière M. Seyot, M. Pedro Calafat.

*Les cinq grands groupes des Agaricacées suivant les traités de mycologie :*

- |    |                    |            |
|----|--------------------|------------|
| 1° | le groupe à spores | blanches ; |
| 2° | —                  | roses ;    |
| 3° | —                  | ocracées ; |
| 4° | —                  | pourpres ; |
| 5° | —                  | noires.    |

Au-dessus de ces cinq grands groupes se trouvaient des champignons géants appartenant à différents genres et les Bolets, les Polyporées, Hydnées, Clavariées, Lycoperdées, etc.

Notre local s'étant révélé petit, dès le premier instant, le stand a été agrandi par les bons soins de M. Hocquard. Cette amélioration a permis de mettre sur les côtés et en évidence les champignons vendus sur le marché de Metz, les champignons que l'on ne doit jamais cueillir, ainsi que les espèces moins communes ou impropres à la consommation de par leur consistance *ligneuse*.

Un précieux stimulant nous a été donné par la présence de MM<sup>mes</sup> Delafosse, Delort, V<sup>ve</sup> Henry, Broyer et Bertrand, lesquelles ne nous ont pas ménagé leur activité, leur encouragement et leurs remarques spirituelles.

M<sup>me</sup> Carles, accompagnée de sa famille, nous a honorés de sa présence. M. le Maire de Metz nous a rendu visite à deux reprises différentes et a prouvé, par là, l'intérêt qu'il portait à notre manifestation. Il faut féliciter tout particulièrement M. Broyer qui s'était donné comme tâche d'alimenter l'exposition pendant quatre jours, ce qui nous a permis de dépasser les 200 espèces.

Notre compte rendu serait bien incomplet si je passais sous silence les critiques faites par les visiteurs. Ce sont ces critiques qui doivent nous tracer le chemin pour l'avenir.

#### *Critiques*

Il y a trop de champignons; on ne sait plus ce qu'on a vu, en sortant.

#### *Réponses*

Le but d'une exposition est d'en faire connaître le plus possible au public, chaque visiteur s'intéresse aux champignons de la région habitée par lui, et il est content de voir exposées les espèces qu'il connaît déjà, par conséquent, il faut en avoir beaucoup à présenter.

---

On aurait dû faire cette exposition dans un local plus approprié et plus vaste; on est trop bousculé.

---

Pour un début, il nous a fallu nous contenter de ce qu'on avait mis bénévolement à notre disposition, mais par la suite, étant donné qu'on se rend compte de l'importance d'une telle exposition, on pourra devenir un peu plus exigeant.

### *Critiques*

Pour ce qui est des champignons qui prêtent à confusion, on aurait dû placer les bons à côté des mauvais.

---

Les étiquettes ne sont pas assez visibles. Chaque champignon exposé devrait porter une étiquette « bon » ou « mauvais ».

---

Pourquoi ne fait-on pas de conférences ? Elles seraient pourtant bien nécessaires.

---

Nous pouvons conclure que le grand public, beaucoup plus qu'on est tenté de le croire, s'intéresse aux champignons, et partant de ce principe, toute manifestation mycologique devra prendre pour base l'accessibilité à tous. La grande majorité du public aime à manger des champignons, mais devant l'incertitude de comestibilité, elle préfère s'abstenir. Par conséquent il serait absolument nécessaire de faire suivre toute manifestation mycologique d'une dégustation qui, plus que toute autre chose, donnerait confiance au public.

### *Réponses*

Le mycologue exige que les champignons soient classés dans l'ordre de la couleur des spores, celui qui visite une exposition le fait, son livre à la main. C'est dans un minimum de temps qu'il doit pouvoir vérifier les caractères des espèces exposées, et sans avoir à faire de longues recherches dans son livre pour repérer les espèces qui l'intéressent plus particulièrement.

---

Sur ce point nous sommes d'accord à satisfaire, à la première occasion, ces critiques. Au point de vue « comestibilité », nous avons doté les champignons d'une mention « bon » ou « mauvais », mais nous avons négligé d'apposer cette mention aux espèces qui présentent des caractères ligneux ou sont trop petites. Toutefois, bonne note est prise de ces remarques.

---

Il ne fallait pas songer à faire des conférences, puisque la place était des plus restreintes pour les visiteurs. Toutefois si à l'avenir, le local le permettait, il serait souhaitable que des conférences fussent données.

---

La profonde méfiance que le public manifeste pour les champignons, provient du fait que ceux-ci sont considérés par la grande majorité comme un produit de fermentation fortuite, spontanée et irrégulière. Le public admet difficilement la possibilité d'un contrôle certain de comestibilité.

L'ignorance est complète. Certaines personnes sont stupéfaites d'apprendre que le champignon se reproduit par les spores, tout comme la plante par la semence. Ce détail connu, elles admettent alors la constance des caractères des espèces et prennent confiance dans leur classification méthodique.

Il serait donc de la plus grande utilité que les expositions mettent en évidence par de grands panneaux explicatifs les modalités de la reproduction. Les conférences elles-mêmes devraient développer les explications données par les dits panneaux.

Au sujet de la classification, une seule protestation a été présentée par une personne pourtant compétente puisqu'elle est l'auteur d'un guide mycologique réputé. Il s'agissait de la classification d'une « Amanite des Césars » qu'elle affirmait être une « Amanita muscaria ». Il est vrai que l'Amanite des Césars est très rare en notre région et qu'on la rencontre très peu souvent.

C'est sans doute une erreur provenant d'une mauvaise visibilité de la part de ce mycologue, car les caractères sont trop frappants et trop nets pour donner lieu à confusion — par conséquent protestation sans portée pratique.

Je ne voudrais pas non plus passer sous silence le côté comique qui présente quand même et bien souvent un certain intérêt :

Un monsieur et une dame attendent leur tour pour entrer ; le monsieur, sur un ton d'étonnement pointillé, dit à la dame : « C'est ici l'exposition des champignons ? » Et la dame de répondre aussitôt : « Mais tu sais bien que la Société d'Histoire Naturelle est bien pauvre et qu'elle ne peut faire mieux. »

Le vendredi 4 octobre, un Monsieur paraissant âgé d'une soixantaine d'années, fait le tour des espèces exposées, un pendule à la main. Il prétend déceler instantanément si le champignon est comestible ou s'il est mauvais. Le rapporteur lui présente un « *Pholiota mutabilis* » et un « *Hypholoma fasciculare* ». Le pendule indique bon pour le premier et mauvais pour le deuxième, d'où pronostic exact. Mais le rapporteur qui est très circonspect dans cette nouvelle science de radiesthésie, présente au pendule deux autres champignons, une belle Amanite phalloïde et un « *Clitocybe geotropa* ». Le radiesthésiste ne connaissait pas les champignons, il est très fier de faire remarquer que le premier est bon et le second mauvais, d'où erreur très grave et très imprudente. Ensuite lui sont présentés d'une main « *Entoloma lividum* » et de l'autre « *Tricholoma terreum* ». Le radiesthésiste prétend le pendule affirma-

tif : bon pour le premier, mauvais pour le second. Le pendule avait eu la chance d'osciller juste pour les deux premières espèces, mais par contre avait indiqué malheureusement comme bons les deux plus dangereux des champignons. L'observation en fut faite au radiesthésiste. Il était accompagné d'un homme dans les 35 ans, paraissant être son gendre ; celui-ci releva ces erreurs flagrantes et lui dit : « Vous ne me ferez pas manger de champignons que vous croyez avoir reconnus bons avec votre pendule. »

Je suis particulièrement heureux de vous faire part d'une constatation faite par MM. Delafosse et Bertrand, lesquels s'étonnant de voir une telle affluence, ont voulu se rendre compte des entrées, et, à l'aide de leur chronomètre, ces messieurs ont trouvé le chiffre respectable de 900 entrées environ à l'heure, au moment de l'affluence.

Permettez-moi de vous dire que nous sommes convaincus d'avoir trouvé et suivi le bon chemin, puisque l'exposition a obtenu un très grand succès, et notre Société a augmenté son prestige.

Une intimité plus grande et plus active s'est faite avec la Société Lorraine de Mycologie de Nancy.

L'utilité de notre Société s'est affirmée grandement aux yeux des autorités et du public.

Nous avons réussi ces différentes manifestations sans attaquer en quoi que ce soit notre caisse, mais bien au contraire, nous croyons avoir augmenté son actif.

Nous avons établi d'une manière concrète le dévouement désintéressé de la Société envers la Science et le bien public.

Nous avons, en un mot, fait pour le mieux pour en escompter votre approbation.

---

# LISTE DES CHAMPIGNONS

## ayant figuré à l'Exposition de Metz

DU 6 AU 15 OCTOBRE 1935

---

Les genres sont classés d'après l'A. B. C. Mycologiques

---

11. Anamites. — Genre *Anamita*. — *A. alba*. — *A. caesarea*. — *A. citrina*. — *A. fulva*. — *A. inaurata*. — *A. muscaria*. — *A. pantherina*. — *A. phalloïdes*. — *A. rubescens*. — *A. spissa*. — *A. vaginata*.
10. Lépiotes. — Genre *Lepiota*. — *L. acutesquamosa*. — *L. amianthina*. — *L. cristata*. — *L. clypeolaria*. — *L. excoriata*. — *L. gracilentata*. — *L. granulosa*. — *L. procera*. — *L. pudica*. — *L. rhacodes*.
4. Armillaires. — Genre *Armillaria*. — *A. aurantia*. — *A. bulbigerata*. — *A. luteovirens*. — *A. mellea*.
16. Tricholomes. — Genre *Tricholoma*. — *T. acerbum*. — *T. albo-bruneum*. — *T. conglobatum*. — *T. equestre*. — *T. melaleucum*. — *T. murinaceum*. — *T. nudum*. — *T. panaeolum*. — *T. russula*. — *T. rutilans*. — *T. saevum*. — *T. saponaceum*. — *T. sejunctum*. — *T. sulfureum*. — *T. terreum*. — *T. vacinum*.
4. Collybies. — Genre *Collybia*. — *C. erythropus*. — *C. fusipes*. — *C. grammocephala*. — *C. radicata*.
2. Mycènes. — Genre *Mycena*. — *M. galericulata*. — *M. pura*.
8. Clitocybes. — Genre *Clitocybe*. — *C. cyathiformis*. — *C. geotropa*. — *C. gymnopodia*. — *C. infundibuliformis*. — *C. inversa*. — *C. laccata* ou *Laccaria laccata*. — *C. nebularis*. — *C. viridis*.
1. Pleurote. — Genre *Pleurotus*. — *P. olearius* ou *Clitocybe phosphoreus*.

1. Lentine. — Genre *Lentinus*. — *L. cochleatus*
1. Pane. — Genre *Panus*. — *P. stypticus*.
2. Chanterelles. — Genre *Cantharellus*. — *C. cibarius*. — *C. cine-reus*.
10. Hygrophores. — Genre *Hygrophorus*. — *H. agathosmus*. — *H. chrysodon*. — *H. coccineus*. — *H. conicus*. — *H. cossus*. — *H. niveus*. — *H. obrusceus*. — *H. psittacinus*. — *H. pudorinus*. — *H. virgineus*.
3. Marasmes. — Genre *Marasmius*. — *M. erythropus*. — *M. oreades*. — *M. ramealis*.
10. Lactaires. — Genre *Lactarius*. — *L. azonites*. — *L. controversus*. — *L. deliciosus*. — *L. sanguifluus*. — *L. subdulcis*. — *L. theiogalus*. — *L. torminosus*. — *L. uvidus*. — *L. vellereus*. — *L. volemus*.
15. Russules. — Genre *Russula*. — *R. adusta*. — *R. amena*. — *R. aurata*. — *R. cyanoxantha*. — *R. delica*. — *R. depallens*. — *R. emetica*. — *R. fellea*. — *R. foetens*. — *R. lepida*. — *R. nigricans*. — *R. ocracea*. — *R. Queletii*. — *R. rubra*. — *R. xerampelina*.
1. Volvaire. — Genre *Volvaria*. — *V. bombycina*.
3. Entolomes. — Genre *Entoloma*. — *E. clypeolaria*. — *E. lividum*. — *E. rhodopolium*.
1. Clitopile. — Genre *Clitopilus*. — *C. prunulus*.
1. Plutée. — Genre *Pluteus*. — *P. cervinus*.
4. Pholiotés. — Genre *Pholiota*. — *P. destruens*. — *P. mutabilis*. — *P. radicata*. — *P. squarrosa*.
8. Cortinaires. — Genre *Cortinarius*. — *C. alboviolaceus*. — *C. Berkeleyi*. — *C. collinitus*. — *C. glaucopus*. — *C. multifor-mis*. — *C. orichalceus*. — *C. variicolor*. — *C. violaceus*.
2. Hebelomes. — Genre *Hebeloma*. — *H. crustuliniforme*. — *H. sinapisans*.
2. Paxilles. — Genre *Paxillus*. — *P. atrotomentosus*. — *P. involutus*.
2. Crepidotes. — Genre *Crepidotus*. — *C. mollis*. — *C. junquillea*.
1. Inocybe. — Genre *Inocybe*. — *I. rimosa*.
6. Pratelles. — Genre *Pratella*. — *P. arvensis*. — *P. augusta*. — *P. campestris*. — *P. hemorrhoidaria*. — *P. pratensis*. — *P. sylvicola*.
1. Strophaire. — Genre *Stropharia*. — *P. aeruginosa*

3. Hypholomes. — Genre *Hypholoma*. — *H. fasciculare*. — *H. hydrophilum*. — *H. sublateritium*.
3. Coprins. — Genre *Coprinus*. — *C. atramentarius*. — *C. comatus*. — *C. micaceus*.
2. Gomphides. — Genre *Gomphidius*. — *G. glutinosus*. — *G. viscidus*.
1. Panéole. — Genre *Panaeolus*. — *P. papillionaceus*.
13. Bolets. — Genre *Boletus*. — *B. aereus*. — *B. aurantiacus*. — *B. bovinus*. — *B. castaneus*. — *B. chrysenteron*. — *B. crocipodius*. — *B. edulis*. — *B. erythropus*. — *B. luteus*. — *B. pinicola*. — *B. satanas*. — *B. scaber*. — *B. submentosus*.
6. Polypores. — Genre *polyporus*. — *P. betulinus*. — *P. frondosus*. — *P. giganteus*. — *P. perennis*. — *P. squamosus*. — *P. versicolor*.
1. Dédalée. — Genre *Daedalea*. — *D. quercina*.
1. Tramète. — Genre *Trametes*. — *T. gibbosa*.
1. Lenzite. — Genre *Lenzites*. — *L. saepiaria*.
3. Hydnes. — Genre *Hydnum*. — *H. imbricatum*. — *H. repandum*. — *H. rufescens*.
1. Sparassis. — Genre *Sparassis*. — *S. crispa*.
8. Clavaires. — Genre *Clavaria*. — *C. aurea*. — *C. cinerea*. — *C. cristata*. — *C. flava*. — *C. formosa*. — *C. pistillaris*. — *C. rugosa*. — *C. vermicularis*.
1. Craterelle. — Genre *Craterellus*. — *C. cornucopioides*.
1. Calocère. — Genre *Calocera*. — *C. viscosa*.
1. Auriculaire. — Genre *Auricularia*. — *A. tremelloïdes*.
1. Phallus. — Genre *Phallus*. — *P. impudicus*.
3. Lycoperdons. — Genre *Lycoperdon*. — *L. excipuliforme*. — *L. gemmatum*. — *L. piriforme*.
1. Boviste. — Genre *Bovista*. — *B. gigantea*.
1. Geaster. — Genre *Geaster*. — *G. fimbriatus*.
4. Pezizes. — *Acetabula acetabulum*. — *Aleuria vesiculosa*. — *Bulgaria inquinans*. — *Peziza aurantia*.
2. Helvelles. — Genre *Helvella*. — *H. crispa*. — *H. lacunosa*.

W. DELAFOSSE.

# Société Mycologique de Commercy

## ET DES ENVIRONS

---

Mercredi 27 mars 1935, à 20 h. 30, dans une des salles de l'Hôtel de Ville de Commercy, sur l'appel fait par un groupe de mycologues, se trouvaient réunies une quarantaine de personnes en vue de la constitution d'une société de mycologie.

L'assemblée, où nous avons remarqué avec plaisir la présence de quelques dames, était présidée par M. le Docteur Morelle, maire de la ville de Commercy, ayant à ses côtés M<sup>e</sup> Thiriot, notaire honoraire, président du comité provisoire, et M<sup>e</sup> Parmentier, notaire, comme secrétaire.

M<sup>e</sup> Thiriot, en quelques mots aimables, remercie M. le Docteur Morelle et les personnes présentes de leur bonne volonté et de l'encouragement apportés aux organisateurs par leur nombre. M. Morelle, en ses qualités de maire de la ville de Commercy, de docteur en médecine et de docteur en pharmacie, nous dit tout l'intérêt qu'il attache à la naissance d'une nouvelle société dans notre ville, ainsi qu'au but poursuivi.

Il développe ce sujet d'une façon remarquable à la satisfaction de tous les auditeurs.

Le bureau de la nouvelle société est ainsi formé :

*Président d'honneur* : M. le Docteur MORELLE, maire de Commercy ;

*Président actif* : M<sup>e</sup> THIRIOT, notaire honoraire à Commercy ;

*Vice-présidents* : MM. HENNEMANN, directeur de l'Ecole Normale ; HUIN, professeur honoraire ;

*Secrétaire technique* : M. GODEL, chapelier, à Commercy ;

*Secrétaire trésorier* : M<sup>e</sup> PARMENTIER, notaire ;

*Secrétaire adjoint* : M. BECK, secrétaire en chef de la mairie de Commercy ;

*Organisateurs des expositions et excursions* : M. BOUTHEGOURD, chirurgien-dentiste ; M. ULRICH, industriel ;

*Inspecteur du marché des champignons* : M. CHARLIER, docteur vétérinaire ;

*Membres consultatifs à Commercy* : MM. BASTIAN (Louis), directeur de la Banque Varin Bernier ; DROUIN (René), industriel à Commercy ; GODEL, chapelier, place de l'Hôtel-de-Ville ; HENNEQUIN, capitaine d'artillerie ; MALARD (Georges), pharmacien ;

*Membres conseillers à Euville* : MM. l'abbé HAZARD ; MAULARD (André) ;

*Membre conseiller A Laneuville* : M. l'abbé GUGNON ;

*Membre conseiller à Vaucouleurs* : M. MICHEL, directeur de la banque Varin Bernier ;

*Membre conseiller à Void* : M. RICHIER, vétérinaire.

L'Assemblée décide ensuite de s'affilier à la Société Mycologique de Nancy en raison des avantages procurés, tels que : concours de M. Seyot, professeur de la Faculté de Pharmacie, pour organisations de conférences, d'excursions, d'expositions ; remise de 20 pour cent sur les ouvrages édités par cette société et envoi de la revue de cette société.

Les membres consultatifs, mycologues avertis, se mettent bénévolement à la disposition de quiconque pour examiner et déterminer tous champignons qui leur seront présentés.

Les adhésions sont ensuite recueillies par le secrétaire, qui est heureux d'annoncer que soixante membres sont déjà inscrits et qu'il se fera un plaisir de renseigner tout nouvel adhérent.

\*\*

Le lundi 4 novembre, à 20 heures, a eu lieu une réunion des membres de la Société, faisant suite à une exposition de champignons.

M<sup>r</sup> Thiriot, président, remercia les membres présents et tout particulièrement ceux qui, samedi soir, avaient fait l'excursion en forêt de Rangéval, excursion pleine de charme, d'où les mycologues savants et même les néophytes avaient rapporté de pleins paniers de champignons. Sur la table étaient exposées plus de cent espèces différentes, toutes déterminées, parmi lesquelles de nombreux champignons mortels, très reconnaissables avec un peu de pratique.

M. Godel, dans un exposé très clair, retint l'attention de ses auditeurs par sa connaissance très étendue de la mycologie, appuyant ses dires par la détermination pratique des champignons exposés.

Le Président et les membres présents remercièrent chaleureusement M. Godel de sa causerie si intéressante et M<sup>r</sup> Thiriot leva la séance, regrettant que tous les amateurs de champignons, et ils sont très nombreux, n'assistent pas à de telles réunions, ce qui, certainement, diminuerait et même arrêterait le nombre des empoisonnements mortels.

*Le Secrétaire* : G. PARMENTIER.

Une surprise fut réservée non seulement aux organisateurs de l'exposition et aux membres présents, il fut en effet remarqué au milieu des champignons exposés un superbe *Bovista gigantea*, dont nul ne put dire ni la provenance ni le moyen d'introduction dans la salle d'exposition à l'Hôtel de Ville.

Etant donné la comestibilité de ce champignon et l'endroit où il était, il fut partagé entre les mycophages l'ignorant qui en firent leurs délices.

\*  
\*\*

### *Liste des Membres actifs*

MM. AUGE (Henri), à Commercy.

AYMARD, à Commercy.

BECK, secrétaire de mairie, à Commercy.

BOUTHEGOURD, chirurgien-dentiste, à Commercy.

BRECHE, économe Ecole Normale, à Commercy.

BONTEMPS, Ecole Pratique, à Commercy.

BASTIAN, directeur Banque Varin, à Commercy.

BOUVELLE, pharmacien, à Lérrouville.

CASTILLARD, propriétaire, à Commercy.

COLIN, professeur en retraite, à Euville.

COLLOT, cultivateur, à Xivray.

CHARLIER, docteur vétérinaire, à Commercy.

CREPIA, ingénieur, à Commercy.

COMMEN, restaurateur, à Lérrouville.

COPPIN, représentant en pharmacie, à Dun-sur-Meuse.

DEMOGE, métreur, à Commercy.

DENAIX, cultivateur, à Ménil-la-Horgne.

DEMOUZON, instituteur, à Commercy.

DROUIN, industriel, à Commercy.

DANGREVILLE, docteur en médecine, à Commercy.

DOUZAIN, docteur en médecine, à Commercy.

M<sup>me</sup> DE BIEMME, place de l'Hôtel-de-Ville, à Commercy.

M. DIRAND, professeur, à Commercy.

M<sup>me</sup> DIDIER, 16, rue de Lisle, à Commercy.

MM. DUPONT, industriel, à Vadonville.

FLOQUET, épicier, à Aulnois.

GOLDITE, docteur en médecine, à Commercy.

GELLY (Pierre), négociant, à Vignot.

GODEL, chapelier, à Commercy.

GUGNON (abbé), curé de Laneuville.

- MM. GROSJEAN, commissaire priseur, à Commercy.  
GODET, entrepreneur de plâtrerie, à Commercy.  
GRANGER (Charles), adjutant au 103<sup>e</sup>, à Commercy.  
HACQUARD, négociant en vins, à Lérrouville.  
HENNEQUIN, capitaine d'artillerie, à Commercy.  
HEBERT, cafetier, à Pont-sur-Meuse.  
HAZARD (abbé), curé d'Euville, à Euville.  
HILAIRE, percepteur, à Commercy.  
HENNEMANN, à Commercy.  
JURION, café de l'Europe, à Commercy.  
LALANNE, capitaine d'artillerie, à Commercy.  
LEPRON, comptable, à Commercy.  
LAURENT, boulanger, à Commercy.  
LEBLAN, vins en gros, à Commercy.  
M<sup>me</sup> LAFLOTTE, rue des Collins, à Commercy.
- MM. MENAGER (Achille), cafetier, à Commercy.  
MORELLE, instituteur, à Sorcy-gare.  
MARTIN, industriel, à Commercy.  
MORELLE, docteur, maire de Commercy.  
MAIGNIEN, dentiste, à Commercy.  
MASSON, huissier, à Commercy.  
MALARD, pharmacien, à Commercy.  
MALO, instituteur.  
MAMELLE, pharmacien, à Commercy.  
MAULARD, employé à la Banque Varin, à Commercy.  
MILLARD, cultivateur, à Xivray.  
MICHEL, directeur Banque Varin, à Vaucouleurs.  
NIVELET, docteur en médecine, à Commercy.  
OROPHANE, ingénieur, à Commercy.  
OUDIETTE, boulanger, à Commercy.  
PIERRAT, colonel d'artillerie, à Châlons-sur-Marne.  
PILLARD, pâtissier, à Commercy.  
PICARD, receveur des contributions, à Commercy.  
PANIS, chirurgien, à Commercy.  
PARMENTIER, notaire, à Commercy.  
RICHER, vétérinaire, à Void.  
ROQUIN, capitaine d'infanterie, à Commercy.  
ROBLOT, instituteur, à Xivray.  
ROULLIER, cafetier, à Commercy.  
ROBILLARD, vins en gros, à Commercy.  
RENAUD, architecte, à Commercy.  
ROBERT, grainetier, à Commercy.  
ROY, capitaine d'artillerie, à Commercy.

- MM. SAUVAGE (abbé), curé de Bouconville.  
STOCQUERT, employé des forges, à Commercy.  
SELLEN, adjudant-chef d'artillerie, à Commercy.  
SERRE, préparateur en pharmacie, à Commercy.  
SALZARD, marchand de chevaux, à Commercy.  
M<sup>lle</sup> SENVEN, institutrice, à Commercy.  
MM. THOMAS (Albert), négociant, à Commercy.  
THIRIOT, notaire honoraire, à Commercy.  
TOUSSAINT, fabricant de madeleines, à Commercy.  
ULRICH, industriel, à Commercy.  
VALFRAY, capitaine d'artillerie, à Commercy.  
VIDAL, capitaine d'artillerie, à Commercy.  
VIAL, professeur, à Commercy.  
VIRY (Vincent), à Gondrecourt.
-

## UN BOLET GÉANT

M. Nicklès, ingénieur aux Services Géographiques de l'Afrique Occidentale Française, et depuis longtemps membre de la Société Lorraine de Mycologie, a pris, l'automne dernier, aux environs de Dakar, l'intéressant cliché ci-dessous d'un Bolet géant.



Ce Bolet a une cuticule brun-roux, des tubes jaunes, des pores jaunes et une chair ferme, blanche, bleuissant légèrement à l'air; les dimensions de l'exemplaire photographié étaient les suivantes: diamètre du chapeau, 0 m. 72 ; diamètre du pied, 0 m. 20 ; hauteur, 0 m. 30.

Il s'agit vraisemblablement de *Boletus sudanicus* (Hariot et Patouillard), espèce signalée dans la Haute-Volta, l'Oubangui et le Chari ; son poids peut dépasser 5 kilos ; il est comestible et très apprécié des indigènes ; il pousse au début de la saison des pluies.

M. Nicklès se propose d'étudier plus attentivement ce géant des Bolets ; il regrette que ses voyages dans l'intérieur des terres ne coïncident pas avec la poussée des champignons, mais il ne désespère pas de pouvoir découvrir d'autres espèces intéressantes et de donner au Bulletin de la Société Lorraine de Mycologie des renseignements sur la flore mycologique de l'Afrique Occidentale Française.

# CLASSIFICATION DES LACTAIRES

---

Pour classer les Lactaires, on peut, suivant les cas, attacher l'importance principale à l'un des quatre caractères suivants :

- 1<sup>o</sup> Aspect du revêtement du chapeau;
- 2<sup>o</sup> Couleur du chapeau;
- 3<sup>o</sup> Couleur du lait;
- 4<sup>o</sup> Odeur.

D'où quatre classifications possibles, ayant chacune comme point de départ l'un de ces quatre caractères.

Les deux premières comprennent toutes les espèces; les deux dernières n'en groupent qu'un petit nombre, celles qui attirent l'attention, soit par la coloration de leur lait, soit par leur odeur.

---

## PREMIÈRE CLASSIFICATION

---

D'après l'aspect du revêtement du chapeau, on divise les Lactaires en trois groupes :

- Lactaires glutineux, à chapeau plus ou moins visqueux, gluant, ou au moins humide-lubrifié . . . . . PREMIER GROUPE
- Lactaires à chapeau sec, glabre ou prumineux, non visqueux, mais parfois faiblement lubrifié . . . . DEUXIÈME GROUPE
- Lactaires à chapeau sec, non visqueux, tomenteux, pubescent ou floconneux . . . . . TROISIÈME GROUPE

## PREMIER GROUPE

Lactaires glutineux, à chapeau plus ou moins visqueux, gluant, ou au moins humide-lubrifié.

☼ A. — Chapeau à bords enroulés et garnis de longs poils ondulés-laineux et feutrés. ☼ 1 — ☼ 2 — ☼ 3.

☼ 1. — Lait blanc, devenant vite jaune à l'air.

Chapeau 10 à 15 $\frac{c}{m}$ ; ocracé-pâle; zoné. Odeur faible et agréable. Saveur âcre.

*L. scrobiculatus.*

N° 18

Dans les bois montagneux et humides de Conifères.

Assez rare.

☼ 2. — Lait blanc, devenant violet à l'air.

Chapeau 9 à 16 $\frac{c}{m}$ ; jaune-paille; à peine zoné. Odeur nulle. Saveur douce, puis amarescente.

*L. repraesentaneus*

N° 19

Dans les bois de Conifères, sur sol siliceux.

1<sup>re</sup> rare.

☼ 3. — Lait blanc, et restant blanc à l'air. ☐ a — ☐ b.

☐ a. — Chapeau noir-verdâtre, ou olivâtre-foncé, avec les bords plus clairs et ocracés; 10 à 30 $\frac{c}{m}$ . Odeur nulle. Saveur âcre.

*L. plumbeus.*

N° 46

Dans les bois sablonneux, non calcaires, surtout sous les Bouleaux.

Assez commun.

☐ b. — Chapeau blanc, ou rosé. ☼ m — ☼ n.

☼ m. — Chapeau non zoné; 4 à 7 $\frac{c}{m}$ ; blanc-crème, ou crème-ocracé. Odeur très faible. Saveur âcre et brûlante.

*L. pubescens.*

N° 10

Dans les marais tourbeux et sous les Bouleaux.

Rare.

☼ n. — Chapeau zoné, ☼ x — ☼ y.

- ✧ x. — Chapeau incarnat-rosé-vif; 4 à 12‰.  
Odeur très faible. Saveur âcre et brûlante.

*L. torminosus.* N° 8.

Sous les Bouleaux, en sol siliceux. Commun.

- ⊕ y. — Chapeau blanc, ou incarnat-rosé-pâle; 5 à 10‰. Odeur très faible. Saveur âcre et brûlante.

*L. cilicioides.* N° 9.

Sous les Bouleaux en sol calcaire. Commun.

- ✧ B. — Chapeau à bords souvent enroulés et parfois pubescents, mais dont les poils sont courts, jamais laineux-feutrés.

- ☼ 1. — Lait rouge. ☐ a — ☐ b.

- ☐ a. — Lait rouge-orangé-vif. Pied creux.

Chapeau 5 à 15‰; orangé-clair, se tachant de vert et devenant vert-de-gris en vieillissant.

Odeur très faible. Saveur âcre, puis agréable.

*L. deliciosus.* N° 25.

Forêts de Conifères. Très commun.

- ☐ b. — Lait rouge-sanguin-sombre, ou rouge-sombre-violacé. Pied plein.

Chapeau 5 à 15‰; incarnat-orangé, se tachant de verdâtre-obscur. Odeur faible de poivre. Saveur âcre, puis agréable.

*L. sanguifluus.* N° 26.

Dans les forêts de Conifères, surtout méridionales. Assez rare.

- ☼ 2. — Lait blanc, devenant rouge-rosé à l'air.

Chapeau 6 à 9‰; souvent excentrique; blanchâtre, gris, bistre, ou enfumé. Odeur nulle. Saveur âcre.

*L. acris.* N° 27.

Dans les bois et les bruyères. Assez commun.

- ☼ 3. — Lait blanc, devenant violet à l'air, et colorant plus ou moins la chair en violet. ☐ a — ☐ b.

- ☐ a. — Chapeau non zoné; 6 à 8 $\frac{c}{m}$ ; gris-violacé-lilacin. Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. uvidus.* N° 30.

Dans les bois argilo-calcaires. Assez commun.

- ☐ b. — Chapeau zoné. ☐ m — ☐ n.

- ☐ m. — Chapeau gris-violacé à brun-violacé; 6 à 12 $\frac{c}{m}$ . Odeur nulle. Saveur douce, puis amarescente.

*L. violascens.* N° 29.

Sous les Bouleaux des marécages siliceux.

Assez commun.

- ☐ n. — Chapeau crème-citrin, ou jaune-paille; 6 à 9 $\frac{c}{m}$ . Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. aspidens.* N° 20.

Dans les bois argileux. Assez commun.

- ☐ 4. — Lait blanc, devenant jaune à l'air, et colorant plus ou moins la chair en jaune ou jaunâtre.

☐ a — ☐ b.

- ☐ a. — Chapeau zoné. ☐ m — ☐ n.

- ☐ m. — Chapeau blanc, ou jaunâtre-carné; zoné de rose-purpurin; 10 à 30 $\frac{c}{m}$ . Lamelles d'abord blanches, puis incarnat-rosé-tendre. Lait blanc, parfois sulfurin. Odeur vireuse, ou de rave. Saveur âcre.

*L. controversus.* N° 1.

En cercles dans les prés et les bosquets humides et ombragés. Commun.

- ☐ n. — Chapeau incarnat-fauve, zoné d'orange; 5 à 8 $\frac{c}{m}$ . Odeur faible et fugace. Saveur douce, puis âcre.

*L. chrysorheus.* N° 4.

Dans les forêts, surtout de Conifères. Commun.

- ☐ *b.* — Chapeau non zoné; gris-lilacin; 8 à 12 $\frac{c}{m}$ .  
Odeur nulle. Saveur très âcre.

*L. trivialis.* N<sup>o</sup> 31.

En troupes dans les forêts de Conifères siliceuses.  
Assez rare.

- ☼ 5. — Lait blanc, devenant gris à l'air, ou tachant les lamelles d'ocracé. ☐ *a* — ☐ *b* — ☐ *c*.

- ☐ *a.* — Chapeau gris-verdoyant, ou olivâtre; 4 à 8 $\frac{c}{m}$ . Pied visqueux. Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. blennius.* N<sup>o</sup> 32.

Dans les forêts de la plaine. Commun.

- ☐ *b.* — Chapeau gris-incarnat-pâlissant; 3 à 5 $\frac{c}{m}$ ; à peine visqueux. Pied sec. Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. vietus.* N<sup>o</sup> 33.

Bois humides de Conifères et tourbières.  
Assez rare.

- ☐ *c.* — Chapeau chamois-blanchâtre, à centre plus ocracé; 4 à 8 $\frac{c}{m}$ . Odeur très faible. Saveur douce, tardivement âcre.

*L. musteus.* N<sup>o</sup> 28.

Dans les bois de Pins des montagnes. Rare.

- ☼ 6. — Lait blanc, ne changeant pas de couleur à l'air et ne tachant pas les lamelles d'ocracé. ☐ *a* — ☐ *b*.

- ☐ *a.* — Chapeau non zoné.

Chapeau ocre-incarnat, ou saumon-abricot-pâle; 6 à 12 $\frac{c}{m}$ . Odeur faible et douce. Saveur douce, puis âcre.

*L. pallidus.* N<sup>o</sup> 23.

En troupes dans les forêts de Hêtres. Assez rare.

- ☐ *b.* — Chapeau zoné. ☐ *m* — ☐ *n* — ☐ *o* — ☐ *p* — ☐ *q* — ☐ *r*.

- *m.* — Chapeau blanc, ou jaunâtre, marbré de rose-purpurin; 10 à 30 $\frac{0}{m}$ . Lamelles devenant roses. Odeur vireuse, ou de rave. Saveur âcre.

*L. controversus.*

N° 1.

En cercles, dans les prés et les bosquets humides et ombragés. Commun.

- *n.* — Chapeau gris-livide, gris-olivâtre, ou gris-bistré; 5 à 9 $\frac{0}{m}$ . Odeur nulle. Saveur très âcre.

*L. pyrogalus.*

N° 34.

Lisières et clairières des forêts siliceuses, surtout sous les Hêtres. Assez commun.

- *o.* — Chapeau bai-clair, ou incarnat-briqueté; 6 à 12 $\frac{0}{m}$ . Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. hyssiginus.*

N° 11.

En troupes dans les bois gramineux et humides de Conifères. Rare.

- *p.* — Chapeau roux-cendré, ou brunâtre-pâlissant; 8 à 12 $\frac{0}{m}$ . Odeur nulle. Saveur âcre.

*L. circellatus.*

N° 35.

Dans les forêts siliceuses ombragées. Rare.

- *q.* — Chapeau crème, citrin-pâle, ou orangé; zoné de fauve-ocracé; 5 à 10 $\frac{0}{m}$ . Odeur faible ou nulle. Saveur âcre.

*L. zonarius.*

N° 21.

Souvent en cercles dans les lisières ou les clairières gramineuses des forêts. Assez rare.

- *r.* — Chapeau jaune-orangé; zoné de cinabre; 4 à 9 $\frac{0}{m}$ . Odeur balsamique et vireuse. Saveur âcre.

*L. Porninsis.*

N° 22.

Sous les Mélèzes des forêts montagneuses.

Assez rare.

## DEUXIÈME GROUPE

Lactaires à chapeau sec, glabre ou pruineux, non visqueux, mais parfois faiblement lubrifié.

✧ A. — Grosses espèces très charnues. ✧ 1 — ✧ 2.

✧ 1. — Chapeau blanc; 10 à 20 %<sub>m</sub>.

Chapeau lisse ou finement ridé-ruguleux. Lamelles décurrentes, serrées, étroites. Lait blanc. Odeur nulle. Saveur poivrée-brûlante.

*L. piperatus.*

N° 2.

En troupes dans les forêts de la plaine.

Très commun.

✧ 2. — Chapeau nankin, fauve-jonquille, brun-safrané, ou rouge-brique; 10 à 12 %<sub>m</sub>. Lait très abondant, blanc et doux. Odeur nulle, puis agréable, devenant fétide après froissement de la chair. Saveur douce et agréable.

*L. volemus.*

N° 41.

Dans les forêts ombragées.

Très commun.

✧ B. — Espèces petites ou moyennes; chapeau n'atteignant pas 10 %<sub>m</sub>. ✧ 1 — ✧ 2.

✧ 1. — Espèces inodores ou à odeur très faible. □ a — □ b.

□ a. — Lait se colorant lentement en jaune à l'air. Chapeau incarnat-briqueté. ✧ m — ✧ n.

✧ m. — Chair épaisse, dure, grenue. Chapeau 5 à 6 %<sub>m</sub>; à marge parfois ridée. Pied vite creux. Saveur douce, puis âcre.

*L. theiogalus.*

N° 5.

En troupes dans les forêts gramineuses et sablonneuses, sur sol siliceux. Peu commun.

- *n.* — Chair mince, spongieuse. Chapeau 3 à 5 $\frac{c}{m}$ ; à marge striée-ridée. Pied plein, puis farci-spongieux. Saveur douce, puis un peu âcre.

*L. tabidus.*

N° 6.

Dans les hauts marais tourbeux du Jura.

- *b.* — Lait blanc, et restant blanc à l'air. ■ *m* —

■ *n* — ■ *o* — ■ *p*.

- *m.* — Chapeau 1 à 2 $\frac{c}{m}$ ; fauve-incarnat, à centre olivâtre et à mamelon olive. Odeur nulle. Saveur douce, puis amarescente.

*L. cyathula.*

N° 15.

En petites troupes sous les Aulnes des terrains siliceux et les bois humides. Peu commun.

- *n.* — Chapeau cannelle-briqueté, peu épais, lisse, poli; 3 à 8 $\frac{c}{m}$ . Odeur nulle. Saveur douceâtre, puis un peu amère.

*L. subdulcis.*

N° 12.

Dans les forêts ombragées. Très commun.

- *o.* — Chapeau brun-briqueté-clair, ou jaune-fauve-brunâtre; 3 à 6 $\frac{c}{m}$ . Lait blanc, abondant et doux. Odeur nulle. Saveur douce, puis un peu âcre.

*L. mitissimus.*

N° 42.

En troupe dans les forêts ombragées. Commun.

- *p.* — Chapeau brunâtre, enfumé-bistré; marge plus pâle, ocracée; 2 à 6 $\frac{c}{m}$ . Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. obnubilus.*

N° 43.

En troupes dans les forêts humides.

Assez rare.

☼ 2. — Espèces nettement odorantes. ☐ a — ☐ b.

☐ a. — Lait blanc, peu abondant, séreux comme de l'eau trouble, ne jaunissant pas à l'air. Odeur faible de punaise, devenant forte et pénétrante de Fenugrec à la dessiccation. Saveur douce.

☼ m — ☼ n.

☼ m. — Chapeau brun-rougeâtre-briqueté; 4 à 6 $\frac{c}{m}$ . Lamelles incarnat-rougeâtre.

*L. camphoratus.* N° 13.

En petites troupes dans les forêts de Conifères.  
Assez commun.

☼ n. — Chapeau brun-fauve, à centre plus foncé; 3 à 4 $\frac{c}{m}$ . Lamelles souci-incarnat.

*L. serifluus.* N° 44.

En petites troupes dans les bois mêlés.  
Assez commun.

☐ b. — Lait blanc-crème, devenant plus jaune à l'air. Odeur fétide de punaise, diminuant, puis disparaissant à la dessiccation. Saveur douce.

☼ m — ☼ n.

☼ m. — Chapeau incarnat-cuivré-pâlissant; 6 à 8 $\frac{c}{m}$ . Lamelles crème, puis incarnat-roussâtre.

*L. quietus.* N° 7.

Dans les bois de Hêtres. Commun.

☼ n. — Chapeau briqueté-roux-cendré; 2 à 5 $\frac{c}{m}$ . Lamelles crème, puis jaune-brunâtre.

*L. subumbonatus.* N° 45.

Dans les prés moussus, les bruyères et les bois rocailleux. Assez rare.

## TROISIÈME GROUPE

**Lactaires à chapeau sec, non visqueux, tomenteux, pubescent ou floconneux.**

- ※ A. — Chapeau blanc. Grosse espèce très charnue. Chapeau recouvert d'un duvet blanc, court et cotonneux; 10 à 20%<sub>m</sub>. Lamelles espacées, épaisses. Odeur nulle. Saveur âcre et poivrée.

*L. vellereus.*

N° 3.

En troupes dans les forêts de la plaine. Très commun.

- ※ B. — Chapeau coloré. Espèces moyennes ou petites.

- ※ 1. — Lait et chair rougissant à l'air. Chapeau non zoné. □ a — □ b.

- a. — Pied cannelé au sommet, sur près de 1%<sub>m</sub> au-dessous des lamelles. Chapeau mamelonné; 5 à 10%<sub>m</sub>; bistre-noirâtre; ridé sillonné. Odeur nulle. Saveur douce et agréable.

*L. lignyotus.*

N° 47.

Dans les sapinières moussues des montagnes.

Rare.

- b. — Pied non cannelé au sommet; chapeau peu ou pas mamelonné; saveur âcre. ■ m — ■ n.

- m. — Chapeau bistre-noir; 3 à 10%<sub>m</sub>.

*L. picinus.*

N° 48.

Dans les bois de Conifères montagneux. Rare.

- n. — Chapeau ocracé-enfumé; 3 à 10%<sub>m</sub>.

*L. fuliginosus.*

N° 49.

En troupes dans les clairières et les lisières des bois.

Assez commun.

- ※ 2. — Lait restant blanc et chair ne se colorant pas à l'air. □ a — □ b — □ c — □ d — □ e.

- ☐ *a.* — Chapeau bistre, ou olive-bistré, puis fuligineux; 5 à 8 $\frac{c}{m}$ . Odeur nulle. Saveur âcre.

*L. umbrinus.*

N<sup>o</sup> 50.

Dans les forêts de Conifères. Haut-Jura.

Assez rare.

- ☐ *b.* — Chapeau brun-roux, ou châtain-briqueté; mamelonné; 5 à 8 $\frac{c}{m}$ . Odeur faible. Saveur poivrée, brûlante.

*L. rufus.*

N<sup>o</sup> 40.

Dans les forêts sablonneuses de Conifères et les tourbières.

Commun.

- ☐ *c.* — Chapeau ocracé, teinté d'incarnat. Champignons odorants. ☐ *m* — ☐ *n*.

- ☐ *m.* — Chapeau ocracé-rosé-incarnat, puis café-au-lait; 5 à 10 $\frac{c}{m}$ . Odeur un peu résineuse, agréable. Saveur douce.

*L. helvus.*

N<sup>o</sup> 14.

Dans les bois humides de Conifères et les tourbières.

Rare.

- ☐ *n.* — Chapeau orangé-clair, ou ocre-orangé; 2 à 5 $\frac{c}{m}$ . Odeur de fruits. Saveur douce, puis brûlante.

*L. subalpinus.*

N<sup>o</sup> 24.

En troupes sous les Aulnes, vers 1,500 m. en Savoie.

Très rare.

- ☐ *d.* — Chapeau gris. ☐ *m* — ☐ *n*.

- ☐ *m.* — Odeur de Cannelle ou de Bergamote. Chapeau gris-perle, puis chamois-lilacé; 2 à 6 $\frac{c}{m}$ . Saveur douce, puis un peu âcre.

*L. glycyosmus.*

N<sup>o</sup> 36.

En troupes dans les forêts humides; sous les Aulnes et les Bouleaux. Assez commun.

- ☐ *n.* — Odeur nulle. ☐ *x* — ☐ *y* — ☐ *z*.

- ⊕ x. — Chapeau gris-sale; très petit, 1 à 3 $\frac{c}{m}$ .  
Saveur douce, puis âcre.

*L. griseus.*

N° 37.

Sous les Aulnes en Savoie.

Très rare.

- ⊕ y. — Chapeau gris-jaunâtre, ou gris-chamois; 3 à 6 $\frac{c}{m}$ ; mamelon élevé et pointu.  
Saveur douce, puis âcre.

*L. mammosus.*

N° 38.

En troupes dans les forêts de Pins et les  
Bouleaux.

Rare.

- ⊕ z. — Chapeau gris-de-plomb, ou gris-lilacé;  
5 à 15 $\frac{c}{m}$ . Saveur très âcre.

*L. flexuosus.*

N° 39.

En troupes dans la mousse et les herbes,  
à la lisière des bois ombragés.

Rare.

- ⊠ e. — Chapeau lilas.    ⊙ m —    ⊙ n.

- ⊙ m. — Chapeau tomenteux; améthyste-lilacin;  
4 à 5 $\frac{c}{m}$ . Odeur faible et agréable. Saveur âcre.

*L. lilacinus.*

N° 16.

Dans les forêts tourbeuses; sous les Aulnes et  
les Bouleaux.

Assez commun.

- ⊙ n. — Chapeau tomenteux, et hérissé d'aiguillons vers la marge; rose-lilacin; 2 à 4 $\frac{c}{m}$ .  
Odeur agréable. Saveur douce, puis poivrée.

*L. spinulosus.*

N° 17

Dans les forêts tourbeuses, sous les Aulnes et  
les Bouleaux.

Rare.

## DEUXIÈME CLASSIFICATION

---

D'après la couleur du chapeau, on divise les Lactaires en sept groupes :

Lactaires à chapeau *blanc* : blanc pur; blanc à peine rosé ou à peine jaunâtre..... PREMIER GROUPE

Lactaires à chapeau *rose* : incarnat-rosé; incarnat-briqueté; incarnat-fauve; incarnat-roussâtre DEUXIÈME GROUPE

Lactaires à chapeau *jaune* : jaune-crème; jaune-citrin; jaune-ocracé; jaune-paille; jaune-orangé..... TROISIÈME GROUPE

Lactaires à chapeau blanchâtre, ou jaunâtre, teinté d'incarnat, de lilas ou d'orangé..... QUATRIÈME GROUPE

Lactaires à chapeau *gris* : gris-blanchâtre; gris-enfumé; gris de plomb; gris-lilacin; gris-violacé; gris-verdâtre..... CINQUIÈME GROUPE

Lactaires à chapeau *brun* : brun-fuligineux; brun-roux; brun-châtain; brun-safrané; brun-orangé..... SIXIÈME GROUPE

Lactaires à chapeau *noirâtre* : ocracé-enfumé; ocracé-noir; bistre-noirâtre; olivacé-noirâtre... SEPTIÈME GROUPE

## PREMIER GROUPE

Lactaires à chapeau blanc : blanc pur ; blanc à peine rosé, ou blanc à peine jaunâtre.

✱ A. — Chapeau visqueux, glutineux, ou humide-lubrifié; blanc-rosé, ou blanc-jaunâtre; plus ou moins zoné. ✱ 1 — ✱ 2.

✱ 1. — Grosse espèce; chapeau de 10 à 30 $\frac{c}{m}$ . Lamelles d'abord blanches, puis incarnat-rosé-tendre. Pied court, souvent excentrique. Lait parfois jaunâtre. Odeur vireuse, ou de rave. Saveur âcre.

*L. controversus.*

N<sup>o</sup> 1.

En cercles dans les prés et les bosquets humides.  
Commun.

✱ 2. — Espèce moyenne; chapeau de 5 à 10 $\frac{c}{m}$ ; à bords enroulés et garnis de longs poils ondulés-laineux et feutrés. Odeur nulle. Saveur très âcre.

*L. cilicioïdes.*

N<sup>o</sup> 9.

Sous les Bouleaux, en sol calcaire. Commun.

✱ B. — Chapeau glabre et lisse, sec, ni visqueux, ni tomenteux; 10 à 20 $\frac{c}{m}$ . Lamelles décurrentes, serrées, étroites. Odeur nulle. Saveur poivrée, brûlante.

*L. piperatus.*

N<sup>o</sup> 2.

En troupes dans les forêts de la plaine.

Très commun.

✱ C. — Chapeau sec, recouvert d'un duvet blanc, court et cotonneux; 10 à 20 $\frac{c}{m}$ . Lamelles espacées, épaisses. Odeur nulle. Saveur âcre et poivrée.

*L. vellereus.*

N<sup>o</sup> 3.

En troupes dans les forêts de la plaine.

Très commun.

## DEUXIÈME GROUPE

Lactaires à chapeau rose : incarnat-rosé; incarnat-briqueté; incarnat-fauve; incarnat-roussâtre.

- ✱ A. — Espèce très grosse. Chapeau de 10 à 30 $\frac{c}{m}$ . Lamelles d'abord blanches, puis incarnat-rosé-tendre. Pied court, souvent excentrique. Lait parfois jaunâtre. Odeur vireuse, ou de rave. Saveur âcre.

*L. controversus.*

N° 1.

En cercles dans les prés et les bosquets humides.

Commun.

- ✱ B. — Espèces moyennes; chapeau ayant de 4 à 12 $\frac{c}{m}$ . ✱ 1 — ✱ 2.

- ✱ 1. — Lait blanc, devenant jaune ou prenant un reflet jaunâtre à l'air. ☐ a — ☐ b.

- ☐ a. — Chapeau zoné; à peine visqueux.

Chapeau 5 à 8 $\frac{c}{m}$ ; incarnat-fauve; zoné de macules orangé-rougeâtre. Lait assez abondant, devenant assez rapidement jaune-soufre à l'air. Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. chrysorheus.*

N° 4.

Dans les forêts, surtout de Conifères. Commun.

- ☐ b. — Chapeau non ou faiblement zoné; non visqueux. Lait peu abondant. ☉ m — ☉ n.

- ☉ m. — Champignons inodores. Chapeau incarnat-briqueté. Lait peu abondant et jaunissant lentement à l'air. ☉ x — ☉ y.

- ☉ x. — Chapeau de 4 à 6 $\frac{c}{m}$ ; à marge tardivement ridée. Pied vite creux. Chair assez épaisse, grenue, fragile.

*L. theiogalus.*

N° 5.

En troupes dans les forêts gramineuses et sablonneuses, sur sol siliceux. Peu commun

- ⊕ y. — Chapeau de 3 à 5 $\frac{c}{m}$ ; à marge striée-ridée. Pied plein. Chair mince et spongieuse.

*L. tabidus.* N° 6.

Dans les hauts marais tourbeux du Jura.

- ⊗ n. — Champignon à odeur fétide de punaise, diminuant, puis disparaissant à la dessiccation. Chapeau 6 à 8 $\frac{c}{m}$ ; incarnat-briqueté. Saveur douce.

*L. quietus.* N° 7.

Dans les bois de Hêtres. Commun.

- ☼ 2. — Lait blanc et restant blanc à l'air. ⊞ a — ⊞ b.

- ⊞ a. — Lait très âcre, brûlant. Bords du chapeau enroulés et garnis de longs poils ondulés-laineux et feutrés. ⊗ m — ⊗ n.

- ⊗ m. — Chapeau zoné; incarnat-rosé-vif; 5 à 12 $\frac{c}{m}$ . Odeur faible. Saveur âcre et brûlante.

*L. torminosus.* N° 8.

Sous les Bouleaux, en sol siliceux. Commun.

- ⊗ n. — Chapeau à peine zoné; blanc, ou incarnat-rosé-pâle; 5 à 10 $\frac{c}{m}$ . Odeur très faible. Saveur âcre et brûlante.

*L. cilicioides.* N° 9.

Sous les Bouleaux en sol calcaire. Commun.

- ⊞ b. — Lait doux, ou d'abord doux, puis âcre. Bords du chapeau dépourvus de longs poils.

⊗ m — ⊗ n — ⊗ o.

- ⊗ m. — Chapeau visqueux.

Chapeau bai-clair, ou incarnat-briqueté; 8 à 12 $\frac{c}{m}$ . Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. hyginus.* N° 11.

En troupes dans les bois gramineux et humides de Conifères. Rare.

■ *n.* — Chapeau glabre et lisse, non visqueux.

⊕ *x* — ⊕ *y*.

⊕ *x.* — Chapeau cannelé-briqueté; peu épais; lisse, poli; 3 à 8 $\frac{c}{m}$ . Odeur nulle. Saveur douceâtre, puis un peu amère.

*L. subdulcis.*

N<sup>o</sup> 12.

Dans les forêts ombragées. Très commun.

⊕ *y.* — Chapeau rougeâtre-briqueté; 4 à 6 $\frac{c}{m}$ . Lamelles incarnat-rougeâtre. Odeur faible de punaise, puis pénétrante de Fenugrec. Lait séreux. Saveur douce.

*L. camphoratus.*

N<sup>o</sup> 13.

En petites troupes dans les forêts de Conifères. Assez commun.

■ *o.* — Chapeau finement tomenteux.

Chapeau ocracé-incarnat, puis café-au-lait; 5 à 10 $\frac{c}{m}$ . Odeur un peu résineuse, agréable. Saveur douce.

*L. helvus.*

N<sup>o</sup> 14.

Dans les bois humides de Conifères et les tourbières. Rare.

✱ C. — Espèces petites; chapeau ayant moins de 5 $\frac{c}{m}$  de diamètre. ■ 1 — ■ 2.

■ 1. — Chapeau glabre, mat, ou lisse, non tomenteux. Lait blanc. □ *a* — □ *b*.

□ *a.* — Chapeau 1 à 2 $\frac{c}{m}$ ; fauve-incarnat, à centre olivâtre et à mamelon vert-olive. Odeur nulle. Saveur douce, puis amarescente.

*L. cyathula.*

N<sup>o</sup> 15.

En petites troupes sous les Aulnes des terrains siliceux et les bois humides. Peu commun.

□ *b.* — Chapeau incarnat-briqueté. Lait se colorant lentement en jaune à l'air. ■ *m* — ■ *n*.

- ☼ *m.* — Chair assez épaisse, dure, grenue; chapeau 5 à 6 $\frac{c}{m}$ ; à marge parfois ridée. Pied vite creux. Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. theiogalus.*

N° 5.

En troupes dans les forêts gramineuses et sablonneuses, sur sol siliceux. Peu commun.

- ☼ *n.* — Chair mince, spongieuse. Chapeau 3 à 5 $\frac{c}{m}$ ; à marge striée-ridée. Pied plein, puis farci-spongieux. Odeur nulle. Saveur douce, puis un peu âcre.

*L. tabidus.*

N° 6.

Dans les hauts marais tourbeux du Jura.

- ☼ 2. — Chapeau tomenteux. ☐ *a* — ☐ *b*.

- ☐ *a.* — Chapeau améthyste-lilacin; 4 à 5 $\frac{c}{m}$ . Odeur faible et agréable. Saveur âcre.

*L. lilacinus.*

N° 16.

Dans les forêts tourbeuses, sous les Aulnes et les Bouleaux. Assez commun.

- ☐ *b.* — Chapeau rose-lilacin; 2 à 4 $\frac{c}{m}$ ; hérissé d'aiguillons vers la marge. Odeur agréable. Saveur douce, puis poivrée.

*L. spinulosus.*

N° 17.

Dans les forêts tourbeuses, sous les Aulnes et les Bouleaux. Rare.

### TROISIÈME GROUPE

Lactaires à chapeau jaune : jaune-crème; jaune-citrin; jaune-ocracé; jaune-paille; jaune-orangé.

- ☼ A. — Chapeau à bords enroulés et garnis de longs poils ondulés-laineux et feutrés. ☼ 1 — ☼ 2 — ☼ 3.

- ☼ 1. — Lait blanc, devenant jaune à l'air, ainsi que la chair. Chapeau 10 à 15 $\frac{0}{m}$ ; ocracé-pâle; zoné. Odeur faible et agréable. Saveur âcre.

*L. scrobiculatus.* N° 18.

Dans les bois montagneux et humides de Conifères.

Assez rare.

- ☼ 2. — Lait blanc, devenant violet à l'air et tachant la chair en violet. Chapeau 9 à 16 $\frac{0}{m}$ ; jaune-paille; à peine zoné. Odeur faible et agréable. Saveur douce, puis amarescente.

*L. repraesentaneus.* N° 19.

Dans les bois siliceux de Conifères. Très rare.

- ☼ 3. — Lait blanc et restant blanc à l'air. Chapeau 4 à 7 $\frac{0}{m}$ ; blanc-crème, ou crème-ocracé; non zoné. Odeur très faible. Saveur âcre et brûlante.

*L. pubescens.* N° 10.

Dans les bois sablonneux, non calcaires, surtout sous les Bouleaux. Rare.

- ✱ B. — Chapeau à bords non garnis de longs poils laineux. ☼ 1 — ☼ 2.

- ☼ 1. — Lait d'abord blanc, puis devenant violet à l'air et tachant la chair en violet. Chapeau 6 à 9 $\frac{0}{m}$ ; crème-citrin, ou jaune-paille; légèrement zoné et visqueux. Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. aspidens.* N° 20.

Dans les bois argileux. Assez commun.

- ☼ 2. — Lait blanc et restant blanc à l'air. ☐ a — ☐ b.

☐ a. — Chapeau zoné. ☐ m — ☐ n.

- ☐ m. — Chapeau crème, citrin-pâle, ou orangé-pâle; zoné de fauve-ocracé; 5 à 10 $\frac{0}{m}$ . Odeur faible ou nulle. Saveur âcre.

*L. zonarius.* N° 21.

Souvent en cercles dans les lisières ou les clairières gramineuses des forêts. Assez rare.

- ☛ *n.* — Chapeau jaune-orangé; zoné de cinabre;  
4 à 9‰. Odeur balsamique et vireuse. Saveur  
âcre.

*L. Porninsis.*

N° 22.

Sous les Mélèzes des forêts montagneuses.  
Assez rare.

- ☐ *b.* — Chapeau non zoné. ☛ *m* — ☛ *n.*

- ☛ *m.* — Chapeau lisse; saumon-abricot, puis  
café-au-lait; 6 à 12‰. Odeur faible et douce.  
Saveur douce, puis âcre.

*L. pallidus.*

N° 23.

En troupes dans les forêts de Hêtres.  
Assez rare.

- ☛ *n.* — Chapeau tomenteux-floconneux; orangé-  
clair ou ocracé-orangé; 2 à 5‰. Odeur de fruits.  
Saveur douce, puis brûlante.

*L. subalpinus.*

N° 24.

En troupes sous les Aulnes, vers 1.500 m. en  
Savoie. Très rare.

## QUATRIÈME GROUPE

Lactaires à chapeau blanchâtre ou jaunâtre, teinté  
d'incarnat, de lilas ou d'orangé.

- ☛ *A.* — Chapeau à bords enroulés et garnis de longs  
poils ondulés-laineux et feutrés. ☛ 1 — ☛ 2.

- ☛ 1. — Chapeau non zoné; 4 à 7‰; blanc-crème, ou  
crème-ocracé. Odeur très faible. Saveur âcre et  
brûlante.

*L. pubescens.*

N° 10.

Dans les marais tourbeux et sous les Bouleaux.  
Assez rare.

☼ 2. — Chapeau zoné. ☐ a — ☐ b.

☐ a. — Chapeau incarnat-rosé-vif; 4 à 12 $\frac{0}{m}$ .  
Odeur très faible. Saveur âcre et brûlante.

*L. torminosus.*

N° 8.

Sous les Bouleaux, en sol siliceux. Commun.

☐ b. — Chapeau blanc, ou incarnat-rosé-pâle; 5 à 10 $\frac{0}{m}$ . Odeur très faible. Saveur âcre et brûlante.

*L. cilicioides.*

N° 9.

Sous les Bouleaux, en sol calcaire. Commun.

✱ B. — Chapeau à bords non garnis de longs poils laineux. ☼ 1 — ☼ 2 — ☼ 3 — ☼ 4 — ☼ 5 — ☼ 6.

☼ 1. — Lait rouge. ☐ a — ☐ b.

☐ a. — Lait rouge-orangé-vif. Pied creux. Chapeau 5 à 15 $\frac{0}{m}$ ; orangé-clair; zoné; se tachant de vert et devenant vert-de-gris en vieillissant. Odeur très faible. Saveur âcre, puis agréable.

*L. deliciosus.*

N° 25.

Dans les forêts de Conifères. Très commun.

☐ b. — Lait rouge-sanguin-sombre, ou rouge-sombre-violacé; se tachant de verdâtre-obscur. Pied plein. Chapeau 5 à 15 $\frac{0}{m}$ . Odeur faible de poivre. Saveur âcre, puis agréable.

*L. sanguifluus.*

N° 26.

Dans les forêts de Conifères, surtout méridionales. Assez rare.

✱ 2. — Lait blanc, devenant rouge-rosé à l'air. Chapeau 6 à 9 $\frac{0}{m}$ ; blanchâtre, gris, bistre, ou enfumé. Odeur nulle. Saveur âcre.

*L. acris.*

N° 27.

Dans les bois et les bruyères. Assez commun.

✱ 3. — Lait blanc, devenant plus ou moins vite jaune-sulfurin à l'air. ☐ a — ☐ b.

▣ a. — Chapeau zoné; légèrement visqueux.

Chapeau 5 à 8 $\frac{c}{m}$ ; incarnat-fauve, zoné de macules orangé-rougeâtre. Lait assez abondant, devenant assez rapidement jaune-soufre à l'air. Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. chrysorheus.*

N° 4.

Dans les forêts, surtout de Conifères. Commun.

▣ b. — Chapeau non ou faiblement zoné; non visqueux; incarnat-briqueté. Lait peu abondant.

☉ m — ☉ n.

☉ m. — Champignons inodores. Lait peu abondant et jaunissant lentement à l'air. ☉ x — ☉ y

☉ x. — Chapeau 4 à 6 $\frac{c}{m}$ ; à marge tardivement ridée. Pied vite creux. Chair assez épaisse, grenue, fragile.

*L. theiogalus.*

N° 5.

En troupes, dans les forêts gramineuses et sablonneuses sur sol siliceux. Peu commun.

☉ y. — Chapeau 3 à 5 $\frac{c}{m}$ ; à marge striée-ridée. Pied plein. Chair mince et spongieuse.

*L. tabidus.*

N° 6.

Dans les hauts marais tourbeux du Jura.

☉ n. — Champignon à odeur fétide de punaise, diminuant, puis disparaissant à la dessiccation. Chapeau 6 à 8 $\frac{c}{m}$ . Saveur douce.

*L. quietus.*

N° 7.

Dans les bois de Hêtres.

Commun.

☉ 4. — Lait blanc, blanc-crème, devenant parfois jaune à l'air. Espèce très grosse. Chapeau de 10 à 30 $\frac{c}{m}$ . Lamelles d'abord blanches, puis incarnat-rosé-tendre. Pied court, souvent un peu excentrique. Odeur vireuse, ou de rave. Saveur âcre.

*L. controversus.*

N° 1.

En cercles dans les prés et les bosquets humides.

Commun.

- ☼ 5. — Lait blanc, devenant gris-sale-cendré à l'air. Chapeau chamois-blanchâtre, à centre plus ocracé; 4 à 8%<sub>m</sub>. Odeur très faible. Saveur douce, tardivement âcre.

*L. musteus.*

N° 28.

Dans les bois de Pins des montagnes.

Rare.

- ☼ 6. — Lait blanc, et restant blanc à l'air. ☐ a — ☐ b.

- ☐ a. — Chapeau visqueux, ou humide-lubrifié; glabre; 6 à 12%<sub>m</sub>; non zoné; ocre-incarnat, ou saumon-abricot-pâle. Odeur faible et douce. Saveur douce, puis âcre.

*L. pallidus.*

N° 23.

En troupes dans les forêts de Hêtres. Assez rare.

- ☐ b. — Chapeau tomenteux. ☉ m — ☉ n.

- ☉ m. — Chapeau ocracé-rosé-incarnat, puis café-au-lait; 5 à 10%<sub>m</sub>. Odeur un peu résineuse, agréable. Saveur douce.

*L. helvus.*

N° 14.

Dans les bois humides de Conifères et les tourbières.

Rare.

- ☉ n. — Chapeau orangé-clair, ou ocre-orangé; 2 à 5%<sub>m</sub>. Odeur de fruits. Saveur douce, puis brûlante.

*L. subalpinus.*

N° 24.

En troupes sous les Aulnes, vers 1.500 m. en Savoie.

Très rare.

## CINQUIÈME GROUPE

Lactaires à chapeau gris : gris-blanchâtre; gris-enfumé; gris-de-plomb; gris-lilacin; gris-violacé; gris-verdâtre.

- ☼ A. — Chapeau plus ou moins visqueux-gluant, ou au moins humide-lubrifié. ☼ 1 — ☼ 2 — ☼ 3 — ☼ 4 — ☼ 5.

- ☼ 1. — Lait blanc, devenant rouge-rosé à l'air.  
Chapeau 6 à 9 $\frac{\circ}{m}$ ; gris-blanchâtre, gris-bistré, ou gris-enfumé. Odeur nulle. Saveur âcre.

*L. acris.*

N° 27.

Dans les bois et les bruyères. Assez commun.

- ☼ 2. — Lait blanc, devenant violet à l'air. ☐ a — ☐ b.

- ☐ a. — Chapeau non zoné; 6 à 8 $\frac{\circ}{m}$ ; gris-violacé-lilacin. Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. vividus.*

N° 30.

Dans les bois argilo-calcaires. Assez commun.

- ☐ b. — Chapeau zoné; 6 à 12 $\frac{\circ}{m}$ ; gris-violacé à brun-violacé. Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. violascens.*

N° 29.

Sous les Bouleaux des marécages siliceux.

Assez commun.

- ☼ 3. — Lait blanc, devenant crème-citrin à l'air.  
Chapeau non zoné; 8 à 12 $\frac{\circ}{m}$ ; gris-lilacin. Odeur nulle. Saveur très âcre.

*L. trivialis.*

N° 31.

En troupes dans les forêts de Conifères siliceuses.

Assez rare.

- ☼ 4. — Lait blanc, devenant gris à l'air, ou tachant les lamelles d'ocracé. ☐ a — ☐ b.

- ☐ a. — Chapeau gris-verdoyant, ou gris-olivâtre; 4 à 8 $\frac{\circ}{m}$ . Pied visqueux. Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. blennius.*

N° 32.

Dans les forêts de la plaine.

Commun.

- ☐ b. — Chapeau gris-incarnat-pâlissant; 3 à 5 $\frac{\circ}{m}$ . Pied sec. Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. vietus.*

N° 33.

Dans les bois humides de Conifères et les tourbières.

Assez rare.

☼ 5. — Lait blanc et restant blanc à l'air. Chapeau zoné. ☐ *a* — ☐ *b*.

☐ *a*. — Chapeau gris-livide, gris-olivâtre ou gris-bistré; 5 à 9 $\frac{c}{m}$ . Odeur nulle. Saveur très âcre.

*L. pyrogalus*. N° 34.

Lisières et clairières des bois siliceux, surtout sous les Hêtres. Assez commun.

☐ *b*. — Chapeau gris-roux-cendré, ou brunâtre-pâlissant; 8 à 12 $\frac{c}{m}$ . Odeur nulle. Saveur âcre.

*L. circellatus*. N° 35.

Dans les forêts siliceuses ombragées. Rare.

✱ B. — Chapeau sec; non visqueux; tomenteux, velouté ou floconneux. ☼ 1 — ☼ 2.

☼ 1. — Odeur de Cannelle ou de Bergamote.

Chapeau gris-perle, puis chamois-lilacé; 2 à 6 $\frac{c}{m}$ . Saveur douce, puis âcre.

*L. glycyosmus*. N° 36.

En troupes dans les forêts humides, sous les Aulnes et les Bouleaux. Assez commun.

☼ 2. — Champignons inodores, ☐ *a* — ☐ *b* — ☐ *c*.

☐ *a*. — Chapeau gris-sale, très petit, 1 à 3 $\frac{c}{m}$ . Saveur douce, puis âcre.

*L. griseus*. N° 37.

Sous les Aulnes, en Savoie. Très rare.

☐ *b*. — Chapeau gris-jaunâtre ou gris-chamois; 3 à 6 $\frac{c}{m}$ ; avec un mamelon élevé et pointu. Saveur douce, puis âcre.

*L. mammosus*. N° 38.

En troupes, dans les forêts, sous les Pins et les Bouleaux. Rare.

☐ *c*. — Chapeau gris-de-plomb, ou gris-lilacé; 5 à 15 $\frac{c}{m}$ . Saveur très âcre.

*L. flexuosus*. N° 39.

En troupes, dans la mousse et les herbes, à la lisière des bois ombragés. Rare.

## SIXIÈME GROUPE

Lactaires à chapeau brun : brun-fuligineux; brun-roux; brun-châtain; brun-safrané; brun-orangé.

☼ A. — Lait âcre et brûlant. ☼ 1 — ☼ 2.

☼ 1. — Chapeau visqueux ou lubrifié; convexe-ombiliqué, puis plan; brun-roux, roux-cendré, ou brunâtre-pâlissant; 8 à 12 $\frac{\circ}{m}$ . Odeur nulle.

*L. circellatus.*

N° 35.

Dans les forêts siliceuses ombragées. Rare.

☼ 2. — Chapeau sec, pubescent, puis lisse et luisant; plan-convexe, mamelonné, 5 à 8 $\frac{\circ}{m}$ ; brun-roux, ou châtain-briqueté. Odeur faible. Saveur poivrée-brûlante.

*L. rufus.*

N° 40.

Dans les forêts sablonneuses de Conifères et les tourbières. Commun.

☼ B. — Lait doux, et restant doux, ou d'abord doux et devenant plus ou moins âcre ou amer. ☼ 1 — ☼ 2.

☼ 1. — Grosse espèce. Chapeau 10 à 12 $\frac{\circ}{m}$ ; nankin, brun-safrané ou brun-rouge-brique. Lait très abondant, blanc et doux. Odeur nulle, puis agréable, devenant fétide après le froissement de la chair. Saveur douce et agréable.

*L. volemus.*

N° 41.

Dans les forêts ombragées. Très commun.

☼ 2. — Espèces moyennes ou petites, chapeau n'atteignant pas 10 $\frac{\circ}{m}$ . ☐ a — ☐ b.

☐ a. — Champignons inodores. ☐ m — ☐ n  
— ☐ o — ☐ p.

- *m.* — Chapeau fauve-incarnat; 1 à 2 $\frac{0}{m}$ ; à centre olivâtre et à mamelon vert-olive. Saveur douce, puis amarescente.

*L. cyathula.*

N° 15.

En petites troupes sous les Aulnes des terrains siliceux et les bois humides. Peu commun.

- *n.* — Chapeau cannelle-briqueté; peu épais; lisse, poli; 3 à 8 $\frac{0}{m}$ . Saveur douceâtre, puis un peu amère.

*L. subdulcis.*

N° 12.

Dans les forêts ombragées. Très commun.

- *o.* — Chapeau brun-briqueté-clair, ou jaune-fauve-brunâtre; 3 à 6 $\frac{0}{m}$ . Lait blanc, abondant et doux. Saveur douce, puis un peu âcre.

*L. mitissimus.*

N° 42.

En troupes dans les forêts ombragées. Commun.

- *p.* — Chapeau brunâtre, enfumé-bistré; marge plus pâle, ocracée; 2 à 6 $\frac{0}{m}$ . Saveur douce, puis âcre.

*L. obnubilus.*

N° 43.

En troupes dans les forêts humides. Assez rare.

- *b.* — Champignons odorants. ■ *m* — ■ *n*.

- *m.* — Lait blanc, séreux comme de l'eau trouble, peu abondant, ne jaunissant pas à l'air. Odeur faible de punaise, devenant forte et pénétrante de Fenugrec à la dessiccation. Saveur douce. ⊕ *x* — ⊕ *y*.

- ⊕ *x.* — Chapeau brun-rougeâtre-briqueté; 4 à 6 $\frac{0}{m}$ . Lamelles incarnat-rougeâtre.

*L. camphoratus.*

N° 13.

En petites troupes dans les forêts de Conifères. Assez commun.

⊕ *y*. — Chapeau brun-fauve, à centre plus foncé; 3 à 4 $\frac{c}{m}$ . Lamelles souci-incarnat.

*L. serifluus*. N° 44.

En petites troupes dans les bois mêlés.

Assez commun.

⊗ *n*. — Lait blanc-crème, devenant plus jaune à l'air. Odeur fétide de punaise, devenant plus faible et disparaissant à la dessiccation. Saveur douce. ⊕ *x* — ⊕ *y*.

⊕ *x*. — Chapeau incarnat-cuivré-pâlissant; 6 à 8 $\frac{c}{m}$ . Lamelles crème. Puis incarnat-roussâtre.

*L. quietus*. N° 7.

Dans les bois de Hêtres. Commun.

⊕ *y*. — Chapeau briqueté-roux-cendré; 2 à 5 $\frac{c}{m}$ . Lamelles crème, puis jaune-brunâtre.

*L. subumbonatus*. N° 45.

Dans les prés moussus, les bruyères et les bois rocailleux. Assez rare.

## SEPTIÈME GROUPE

Lactaires à chapeau noirâtre : ocracé-enfumé; ocracé-noir; bistre-noirâtre; olivacé-noirâtre.

⊗ A. — Chapeau à bords enroulés et garnis de longs poils ondulés-laineux et feutrés.

Chapeau visqueux, verdâtre ou olivacé-noirâtre, avec les bords plus clairs et ocracés; 10 à 30 $\frac{c}{m}$ .

*L. plumbeus*. N° 46.

Dans les bois sablonneux, non calcaires, surtout sous les Bouleaux. Assez commun.

⊗ B. — Chapeau à bords non garnis de longs poils laineux. ⊗ 1 — ⊗ 2.

☼ 1. — Lait et chair rougissant à l'air. Chapeau non zoné. ☐ *a* — ☐ *b*.

☐ *a*. — Pied cannelé au sommet, sur près de  $1\frac{0}{m}$  au-dessous des lamelles. Chapeau mamelonné; 5 à  $10\frac{0}{m}$ ; bistre-noirâtre; ridé-sillonné. Odeur nulle. Saveur douce et agréable.

*L. lignyotus*.

N° 47.

Dans les sapinières moussues des montagnes.

Rare.

☐ *b*. — Pied non cannelé au sommet; chapeau peu ou pas mamelonné. Saveur âcre. ☐ *m* — ☐ *n*.

☐ *m*. — Chapeau bistre-noir, couleur de poix; 3 à  $10\frac{0}{m}$ .

*L. picinus*.

N° 48.

Dans les bois de Conifères des montagnes. Rare.

☐ *n*. — Chapeau ocracé-enfumé, ou gris-sale-fuligineux; 3 à  $10\frac{0}{m}$ .

*L. fuliginosus*.

N° 49.

En troupes dans les lisières et les clairières des bois.

Assez commun.

☼ 2. — Lait restant blanc et chair ne se colorant pas à l'air. Chapeau bistre, ou olive-bistré, puis fuligineux; 5 à  $8\frac{0}{m}$ . Odeur nulle. Saveur âcre.

*L. umbrinus*.

N° 50.

Dans les forêts de Conifères. Haut-Jura. Assez rare.



## TROISIÈME CLASSIFICATION

---

D'après la coloration du lait, on divise les Lactaires dont le lait n'est pas blanc, ou ne reste pas blanc à l'air, en cinq groupes :

|                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Lactaires à lait rouge.....                                                                         | PREMIER GROUPE   |
| Lactaires à lait blanc, devenant rouge à l'air, et colorant plus ou moins la chair en rougeâtre...  | DEUXIÈME GROUPE  |
| Lactaires à lait blanc, devenant violet à l'air, et colorant plus ou moins la chair en violet ..... | TROISIÈME GROUPE |
| Lactaires à lait blanc, devenant jaune à l'air, et colorant plus ou moins la chair en jaune.....    | QUATRIÈME GROUPE |
| Lactaires à lait blanc, devenant gris à l'air, ou tachant les lamelles d'ocracé .....               | CINQUIÈME GROUPE |

---

### PREMIER GROUPE

**Lactaires à lait rouge.**

✱ A. — Lait rouge-orangé-vif. Pied creux. Chapeau 5 à 15 $\frac{m}{m}$ ; orangé-clair; zoné; se tachant de vert et devenant vert-de-gris en vieillissant. Odeur très faible. Saveur âcre, puis agréable.

*L. deliciosus.*

N° 25.

Dans les forêts de Conifères.

Très commun.

- ✱ B. — Lait rouge-sanguin-sombre ou rouge-sombre-violacé. Pied plein, se creusant parfois dans la vieillesse. Chapeau 5 à 15 $\frac{\circ}{m}$ ; incarnat-orangé, se tachant de verdâtre-obscur. Odeur faible de poivre. Saveur âcre, puis agréable.

*L. sanguifluus.* N° 26.

Dans les forêts de Conifères, surtout méridionales.  
Assez rare.

## DEUXIÈME GROUPE

Lactaires à lait blanc, devenant rouge à l'air, et colorant plus ou moins la chair en rougeâtre.

- ✱ A. — Chapeau un peu visqueux, ou humide lubrifié; 6 à 9 $\frac{\circ}{m}$ ; souvent excentrique; blanchâtre, gris, bistre, ou enfumé. Odeur nulle. Saveur âcre.

*L. acris.* N° 27.

Dans les bois et les bruyères. Assez commun.

- ✱ B. — Chapeau sec, non visqueux, tomenteux, pubescent, ou floconneux; non zoné. ☼ 1 — ☼ 2.

- ☼ 1. — Pied cannelé au sommet, sur près de 1 $\frac{\circ}{m}$  en dessous des lamelles. Chapeau mamelonné; 5 à 10 $\frac{\circ}{m}$ ; bistre-noirâtre; ridé-sillonné. Odeur nulle. Saveur douce et agréable.

*L. lignyotus.* N° 47.

Dans les sapinières moussues des montagnes. Rare.

- ☼ 2. — Pied non cannelé au sommet. Chapeau peu ou pas mamelonné. Saveur âcre. ☐ a — ☐ b.

- ☐ a. — Chapeau bistre-noir, couleur de poix; 5 à 10 $\frac{\circ}{m}$ .

*L. picinus.* N° 48.

Dans les bois de Conifères des montagnes. Rare.

- ▣ *b.* — Chapeau ocracé-enfumé, ou gris-sale-fulgineux; 5 à 10 $\frac{c}{m}$ .

*L. fuliginosus.*

N° 49.

En troupes dans les lisières et les clairières des bois. Assez commun.

### TROISIÈME GROUPE

Lactaires à lait blanc, devenant violet à l'air, et colorant plus ou moins la chair en violet.

- ✱ A. — Chapeau à bords enroulés et garnis de longs poils ondulés-laineux et feutrés.

Chapeau 9 à 16 $\frac{c}{m}$ ; jaune-paille; à peine zoné. Odeur nulle. Saveur douce, puis amarescente.

*L. repraesentaneus.*

N° 19.

Dans les bois de Conifères, sur sol siliceux. Très rare.

- ✱ B. — Chapeau à bords non garnis de longs poils laineux. ☼ 1 — ☼ 2.

☼ 1. — Chapeau non zoné; 6 à 8 $\frac{c}{m}$ ; gris-violacé-lilacin. Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. uvidus.*

N° 30.

Dans les bois argilo-calcaires. Assez commun.

- ☼ 2. — Chapeau zoné. ▣ *a* — ▣ *b*.

▣ *a.* — Chapeau gris-violacé à brun-violacé; 6 à 12 $\frac{c}{m}$ . Odeur nulle. Saveur douce, puis amarescente.

*L. violascens.*

N° 29.

Sous les Bouleaux des marécages siliceux.

Assez commun.

- ▣ *b.* — Chapeau crème-citrin, ou jaune-paille; 6 à 9 $\frac{c}{m}$ . Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. aspidens.*

N° 20.

Dans les bois argileux.

Assez commun.

## QUATRIÈME GROUPE

Lactaires à lait blanc, devenant jaune à l'air, et colorant plus ou moins la chair en jaune.

✱ A. — Chapeau plus ou moins visqueux, ou humide-lubrifié. ☼ 1 — ☼ 2.

☼ 1. — Chapeau à bords enroulés et garnis de longs poils ondulés laineux et feutrés.

Chapeau 10 à 15 $\frac{c}{m}$ ; ocracé-pâle; zoné. Odeur faible et agréable. Saveur âcre.

*L. scrobiculatus.*

N° 18.

Dans les bois montagneux et humides de Conifères.

Assez rare.

☼ 2. — Chapeau à bords non garnis de longs poils laineux. ☐ a — ☐ b.

☐ a. — Chapeau zoné. ☼ m — ☼ n.

☼ m. — Chapeau blanc, ou jaunâtre-carné; zoné de rose-purpurin; 10 à 30 $\frac{c}{m}$ . Lamelles d'abord blanches, puis incarnat-rosé-tendre. Pied court, un peu conique, souvent excentrique. Odeur vireuse ou de rave. Saveur âcre.

*L. controversus.*

N° 1.

En cercles dans les prés et les bosquets humides et ombragés.

Commun.

☼ n. — Chapeau incarnat-fauve; zoné d'orange; 5 à 8 $\frac{c}{m}$ . Odeur faible et fugace. Saveur douce, puis âcre.

*L. chrysorheus.*

N° 4.

Dans les forêts, surtout de Conifères.

Commun.

- ☐ *b.* — Chapeau non zoné; gris-lilacin; 8 à 12 $\frac{c}{m}$ .  
Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. trivialis.* N° 31.

En troupes dans les forêts de Conifères siliceuses.  
Assez rare.

- ✱ B. — Chapeau sec, glabre, non visqueux; incarnat-briqueté. ☼ 1 — ☼ 2.

- ☼ 1. — Chair assez épaisse, dure, grenue. Chapeau 5 à 6 $\frac{c}{m}$ ; à marge parfois ridée. Pied vite creux. Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. theiogalus.* N° 5.

En troupes dans les forêts gramineuses et sablonneuses, sur sol siliceux. Peu commun.

- ☼ 2. — Chair mince, spongieuse. Chapeau 3 à 5 $\frac{c}{m}$ ; à marge striée-ridée. Pied plein, puis farci-spongieux. Odeur nulle. Saveur douce, puis un peu âcre.

*L. tabidus.* N° 6.

Dans les hauts marais tourbeux du Jura.

## CINQUIÈME GROUPE

Lactaires à lait blanc, devenant gris à l'air, ou tachant les lamelles d'ocracé.

- ✱ A. — Chapeau gris-verdoyant, ou olivâtre; 4 à 8 $\frac{c}{m}$ .  
Pied visqueux. Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. blennius.* N° 32.

Dans les forêts de la plaine. Commun.

- ✱ B. — Chapeau gris-incarnat-pâlissant; à peine visqueux; 3 à 5 $\frac{c}{m}$ . Pied sec. Odeur nulle. Saveur douce, puis âcre.

*L. vietus.* N° 33.

Dans les bois humides de Conifères et les tourbières.  
Assez rare.

✱ C. — Chapeau chamois-blanchâtre, à centre plus ocracé; 4 à 8 $\frac{c}{m}$ . Odeur très faible, Saveur douce, tardivement âcre.

*L. musteus.*

N° 28.

Dans les bois de Pins des montagnes.

Rare.

---

## QUATRIÈME CLASSIFICATION

---

### LACTAIRES ODORANTS

Beaucoup de Lactaires sont totalement dépourvus d'odeur ; quelques espèces ont une odeur très faible et peu définissable ; une dizaine d'espèces sont nettement odorantes et peuvent être distinguées les unes des autres, d'après les indications ci-dessous.

A. — Chapeau visqueux, jaune-orangé ; odeur balsamique ..... (4 à 9) *L. Porninsis* N° 22

B — Chapeau sec et glabre.

1. Lait blanc-séreux, ne jaunissant pas.

Odeur de punaise, puis de Fenugrec { chapeau brun-brûlé .. (4 à 6) *L. camphoratus* N° 13

{ chapeau brun-fauve .. (3 à 4) *L. seriffusus* N° 44

2) Lait blanc-crème, puis plus jaune. Odeur de punaise, disparaissant { chapeau cuivré-pâle .. (6 à 8) *L. quietus* N° 7

{ chapeau briqueté - roux-cendré. (2 à 5) *L. subumbonatus* N° 45

C. — Chapeau sec et tomenteux.

1. Odeur résineuse agréable..... (5 à 10) *L. helvus* N° 14

2. Odeur de fruits..... (2 à 5) *L. subalpinus* N° 24

3. Odeur faible et agréable { chapeau améthyste-lilacin, tomenteux (4 à 5) *L. lilacinus* N° 16

{ chapeau rose lilacin, hérissé d'aiguillons. (2 à 4) *L. spinulosus* N° 17

---

# RÉSUMÉ

## DE LA PREMIÈRE CLASSIFICATION

(Les chiffres entre parenthèses indiquent le diamètre du chapeau).

### PREMIER GROUPE

#### LACTAIRES A CHAPEAU GLUTINEUX, VISQUEUX, OU HUMIDE-LUBRIFIÉ

##### A. — Bords du chapeau garnis de longs poils laineux et feutrés.

|                                        |                                 |                        |                        |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1) Lait blanc, devenant jaune à l'air  | ( 10 à 15)                      | <i>scrobiculatus</i>   | N° 18                  |
| 2) Lait blanc, devenant violet à l'air | ( 9 à 16)                       | <i>repraesentaneus</i> | N° 19                  |
|                                        | chapeau noir-verdâtre (10 à 30) | <i>plumbeus</i>        | N° 46                  |
| 3) Lait restant                        | chapeau non                     |                        |                        |
| blanc                                  | zoné . . . . ( 4 à 7)           | <i>pubescens</i>       | N° 10                  |
| à                                      | chapeau blanc                   | (incarnat-             |                        |
| l'air                                  | ou rosé                         | chapeau vif ( 4 à 12)  | <i>torminosus</i> N° 8 |
|                                        | zoné                            | blanc-rosé             |                        |
|                                        | ( 5 à 10)                       | <i>cilicioides</i>     | N° 9                   |

##### B. — Bords du chapeau dépourvus de longs poils laineux.

|                                        |                                                   |                    |       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1) Lait rouge                          | { lait rouge-orangé-vif;<br>pied creux ( 5 à 15)  | <i>deliciosus</i>  | N° 25 |
|                                        | { lait rouge-sombre; pied<br>plein ( 5 à 15)      | <i>sanguifluus</i> | N° 26 |
| 2) Lait blanc, puis rouge-rosé à l'air | ( 6 à 9)                                          | <i>acris</i>       | N° 27 |
|                                        | chapeau non zoné ( 6 à 8)                         | <i>uvividus</i>    | N° 30 |
| 3) Lait blanc, devenant violet à l'air | { chapeau gris-<br>violacé ( 6 à 12)              | <i>violascens</i>  | N° 29 |
|                                        | { chapeau jaune-citrin<br>à jaune-paille ( 6 à 9) | <i>aspideus</i>    | N° 20 |

|                                                  |                       |                                                             |                     |       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 4) Lait blanc,<br>devenant<br>jaune à l'air      | chapeau<br>zoné       | chapeau très gros,<br>zoné de rose-pur-<br>purin (12 à 30)  | <i>controversus</i> | N° 1  |
|                                                  |                       | chapeau moyen, zoné<br>d'orange (5 à 8)                     | <i>chrysorheus</i>  | N° 4  |
|                                                  | chapeau non zoné      | (8 à 12)                                                    | <i>trivialis</i>    | N° 31 |
|                                                  |                       | chapeau gris-verdoyant (4 à 8)                              | <i>blennius</i>     | N° 32 |
| 5) Lait<br>devenant<br>gris à l'air              | chapeau gris-incarnat | (3 à 5)                                                     | <i>vietus</i>       | N° 33 |
|                                                  |                       | chapeau chamois-blân-<br>châtre (4 à 8)                     | <i>musteus</i>      | N° 28 |
|                                                  | chapeau non zoné      | (6 à 12)                                                    | <i>pallidus</i>     | N° 23 |
|                                                  |                       | chapeau blanchâtre<br>(12 à 30)                             | <i>controversus</i> | N° 1  |
| 6) Lait blanc,<br>ne changeant<br>pas<br>à l'air | chapeau<br>zoné       | chapeau gris-livide<br>ou gris-olivâtre -<br>bistré (5 à 9) | <i>pyrogalus</i>    | N° 34 |
|                                                  |                       | chapeau bai-clair ou<br>incarnat-briqueté<br>(6 à 12)       | <i>hysginus</i>     | N° 11 |
|                                                  |                       | chapeau roux-cen-<br>dré (8 à 12)                           | <i>circellatus</i>  | N° 35 |
|                                                  |                       | chapeau crème-ci -<br>trin (5 à 8)                          | <i>zonarius</i>     | N° 21 |
|                                                  |                       | chapeau jaune-orangé<br>(4 à 9)                             | <i>Porninsis</i>    | N° 22 |
|                                                  |                       |                                                             |                     |       |

## DEUXIÈME GROUPE

## LACTAIRES A CHAPEAU GLABRE, NI VISQUEUX, NI TOMENTEUX

|                                                               |                 |               |                |                  |       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|-------|
| a)                                                            | Grosses espèces | chapeau blanc | (10 à 20)      | <i>piperatus</i> | N° 21 |
| chapeau nankin-fauve                                          |                 |               |                |                  |       |
| ou brun-safrané                                               |                 | (10 à 12)     | <i>volemus</i> | N° 41            |       |
| b) Espèces moyennes ou petites; chapeau n'atteignant pas 10‰. |                 |               |                |                  |       |

## M. — Espèces inodores.

|                                             |                                        |                   |      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------|
| 1) Lait blanc,<br>devenant<br>jaune à l'air | chair épaisse et grenue (3 à 6)        | <i>theiogalus</i> | N° 5 |
|                                             | chair mince et spon-<br>gieuse (2 à 5) | <i>tabidus</i>    | N° 6 |

|                                                  |   |                                 |         |                   |       |
|--------------------------------------------------|---|---------------------------------|---------|-------------------|-------|
| 2) Lait blanc,<br>et restant<br>blanc<br>à l'air | { | chapeau fauve-incarnat          |         |                   |       |
|                                                  |   |                                 | (1 à 2) | <i>cyathula</i>   | N° 15 |
|                                                  |   | chapeau cannelle-bri-<br>queté  | (3 à 8) | <i>subdulcis</i>  | N° 12 |
|                                                  |   | chapeau brun-briqueté           | (3 à 6) | <i>mitissimus</i> | N° 42 |
|                                                  |   | chapeau brun-bistre-en-<br>fumé | (2 à 6) | <i>obnubilus</i>  | N° 43 |

## N. — Espèces odorantes.

|                                                                       |   |                               |         |                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|---------|---------------------|-------|
| 1) Lait blanc-<br>séreux, odeur<br>de punaise,<br>puis de<br>Fenugrec | { | chapeau brun-rouge            | (4 à 6) | <i>camphoratus</i>  | N° 13 |
|                                                                       |   | chapeau brun-fauve            | (3 à 4) | <i>serifluus</i>    | N° 44 |
| 2) Lait blanc-<br>crème, odeur<br>de punaise,<br>s'atténuant          | { | chapeau incarnat-cui-<br>vré  | (6 à 8) | <i>quietus</i>      | N° 7  |
|                                                                       |   | chapeau brun-roux-cen-<br>dré | (2 à 5) | <i>subumbonatus</i> | N° 45 |

## TROISIEME GROUPE

LACTAIRES A CHAPEAU TOMENTEUX, NON VISQUEUX,  
DEVENANT PARFOIS GLABRE ET LISSE

|                                           |                                             |                           |       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------|
| A. — Chapeau blanc.....(10 à 20)          |                                             | <i>vellereus</i>          | N° 3  |
| B. — Chapeau coloré                       |                                             |                           |       |
| 1) Lait et chair<br>rougissant<br>à l'air | { pied cannelé au som-<br>met.....( 6 à 10) | <i>lignyotus</i>          | N° 47 |
|                                           |                                             | { chapeau bistre-noir<br> |       |

|                  |   |                                                 |                   |       |
|------------------|---|-------------------------------------------------|-------------------|-------|
| d) Chapeau gris  | { | odeur de cannelle ( 2 à 6)                      | <i>glycyosmus</i> | N° 36 |
|                  |   | chapeau gris-sale ( 2 à 3)                      | <i>griseus</i>    | N° 37 |
|                  |   | odeur nulle chapeau gris-chamois ( 3 à 6)       | <i>mammosus</i>   | N° 38 |
|                  |   | chapeau gris-de-plomb, ou gris-lilacé ( 5 à 15) | <i>flexuosus</i>  | N° 39 |
|                  |   | chapeau améthyste-lilacin                       |                   |       |
| e) Chapeau lilas | { | ( 4 à 5)                                        | <i>lilacinus</i>  | N° 16 |
|                  |   | chapeau rose-lilacin; hérissé ( 2 à 4)          | <i>spinulosus</i> | N° 17 |

# RÉSUMÉ

## DE LA DEUXIÈME CLASSIFICATION

### PREMIER GROUPE

#### LACTAIRES A CHAPEAU BLANC, OU BLANCHATRE

|                                                                                            |                                                                        |                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Chapeau<br>glutineux-<br>visqueux                                                          | bords du chapeau à longs poils<br>laineux..... ( 5 à 10)               | <i>cilicioïdes</i>  | N° 9 |
|                                                                                            | bords du chapeau sans longs poils;<br>lamelles devenant roses(12 à 30) | <i>controversus</i> | N° 1 |
| Chapeau glabre et lisse, ni visqueux, ni tomenteux; lamelles étroites et serrées (10 à 20) |                                                                        | <i>piperatus</i>    | N° 2 |
| Chapeau tomenteux. Lamelles épaisses et espacées .....(10 à 20)                            |                                                                        | <i>vellereus</i>    | N° 3 |

### DEUXIÈME GROUPE

#### LACTAIRES A CHAPEAU ROSE, OU ROSÉ

|                                                                             |                           |                                                          |                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------|
| A. — Grosse espèce à pied court et à lamelles devenant roses .....(12 à 30) |                           |                                                          | <i>controversus</i> | N° 1 |
| B. — Espèces moyennes ou petites, chapeau ayant de 4 à 12% <sub>m</sub> .   |                           |                                                          |                     |      |
| 1) Lait blanc, jaunissant à l'air.                                          |                           |                                                          |                     |      |
| a) Chapeau zoné, un peu visqueux...( 5 à 8)                                 |                           | <i>chrysorheus</i>                                       | N° 4                |      |
| b) Chapeau<br>à peine<br>zoné, non<br>visqueux                              | { champignons<br>inodores | chair assez épaisse<br>et grenue( 3 à 6)                 | <i>theiogalus</i>   | N° 5 |
|                                                                             |                           | chair mince et spongieuse ( 2 à 5)                       | <i>tabidus</i>      | N° 6 |
|                                                                             |                           | odeur fétide, s'atténuant à la dessiccation.....( 6 à 8) | <i>quietus</i>      | N° 7 |
|                                                                             |                           | 2) Lait blanc, et restant blanc à l'air.                 |                     |      |

|                                                                |                                                  |                   |                                     |                  |                        |                    |                    |       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------|
|                                                                | a) Lait âcre<br>et brûlant                       | {                 | chapeau zoné; incarnat-vif          |                  |                        |                    |                    |       |
|                                                                |                                                  |                   | ( 4 à 12)                           | <i>tominosus</i> | N° 8                   |                    |                    |       |
|                                                                | b) Lait doux<br>ou d'abord<br>doux, puis<br>âcre | {                 | chapeau à peine zoné; incarnat-pâle |                  | ( 5 à 10)              | <i>cilicioïdes</i> | N° 9               |       |
|                                                                |                                                  |                   | chapeau visqueux                    |                  | .... ( 6 à 12)         | <i>hysginus</i>    | N° 11              |       |
|                                                                |                                                  |                   | chapeau                             | {                | inodore                | .... ( 3 à 8)      | <i>subdulcis</i>   | N° 12 |
|                                                                |                                                  |                   |                                     |                  | odeur de Fe-           |                    |                    |       |
|                                                                |                                                  |                   |                                     |                  | nugrec.                | .... ( 4 à 6)      | <i>camphoratus</i> | N° 13 |
|                                                                |                                                  | chapeau tomenteux | ... ( 5 à 10)                       | <i>helvus</i>    | N° 14                  |                    |                    |       |
| C. — Espèces petites, chapeau ayant moins de 5 $\frac{m}{m}$ . |                                                  |                   |                                     |                  |                        |                    |                    |       |
|                                                                | 1) Chapeau<br>glabre                             | {                 | chapeau fauve-incarnat              |                  | ( 1 à 2)               | <i>cyathula</i>    | N° 15              |       |
|                                                                |                                                  |                   | incarnat-                           | {                | chair assez épaisse et |                    |                    |       |
|                                                                |                                                  |                   |                                     |                  | grenue                 | .... ( 3 à 6)      | <i>theiogalus</i>  | N° 5  |
|                                                                | 2) Chapeau<br>tamenteux                          | {                 | briqueté                            | {                | chair mince et spon-   |                    |                    |       |
|                                                                |                                                  |                   |                                     |                  | gieuse                 | .... ( 2 à 5)      | <i>tabidus</i>     | N° 6  |
|                                                                |                                                  |                   |                                     |                  | améthyste-lilacin      | .... ( 4 à 5)      | <i>lilacinus</i>   | N° 16 |
|                                                                |                                                  |                   | rose-lilacin, hérissé               | .... ( 2 à 4)    | <i>spinulosus</i>      | N° 17              |                    |       |

## TROISIÈME GROUPE

## LACTAIRES A CHAPEAU JAUNE, OU JAUNATRE

## A. — Chapeau à bords garnis de longs poils laineux et feutrés.

|                                         |            |                        |       |
|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------|
| 1) Lait blanc, devenant jaune à l'air   | ( 10 à 15) | <i>scrobiculatus</i>   | N° 18 |
| 2) Lait blanc, devenant violet à l'air  | ( 9 à 16)  | <i>repraesentaneus</i> | N° 19 |
| 3) Lait blanc, et restant blanc à l'air | ( 4 à 7)   | <i>pubescens</i>       | N° 10 |

## B. — Chapeau à bords non garnis de longs poils laineux.

|                                        |          |                           |                           |                   |       |
|----------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| 1) Lait blanc, devenant violet à l'air | ( 6 à 9) | <i>aspidens</i>           | N° 20                     |                   |       |
| 2) Lait blanc et rest. blanc           | {        | chapeau ( de fauve-ocracé | ( 5 à 8)                  | <i>zonarius</i>   | N° 21 |
|                                        |          | zoné                      | ( de cinabre ( 4 à 9)     | <i>Porninsis</i>  | N° 22 |
|                                        | {        | chapeau                   | { chapeau lisse ( 6 à 12) | <i>pallidus</i>   | N° 23 |
|                                        |          | non zoné                  | { chapeau tomenteux       |                   |       |
|                                        |          |                           | ( 2 à 5)                  | <i>subalpinus</i> | N° 24 |

## QUATRIÈME GROUPE

## LACTAIRES A CHAPEAU BLANCHATRE, OU JAUNATRE, TEINTÉ D'INCARNAT

## A. — Chapeau à bords garnis de longs poils laineux et feutrés.

|                  |               |                  |       |
|------------------|---------------|------------------|-------|
| Chapeau non zoné | .... ( 4 à 7) | <i>pubescens</i> | N° 10 |
|------------------|---------------|------------------|-------|

- |                 |   |                               |                    |      |
|-----------------|---|-------------------------------|--------------------|------|
| 2. Chapeau zoné | { | incarnat-vif ..... ( 4 à 12)  | <i>torminosus</i>  | N° 8 |
|                 |   | incarnat-pâle ..... ( 5 à 10) | <i>cilicioides</i> | N° 9 |

B. — Chapeau à bords non garnis de longs poils laineux.

- |                                                           |   |                                        |                     |       |
|-----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|---------------------|-------|
| 1. Lait rouge                                             | { | lait rouge-orangé-vif;                 |                     |       |
|                                                           |   | pied creux ..... ( 5 à 15)             | <i>deliciosus</i>   | N° 25 |
|                                                           |   | lait rouge-sombre;                     |                     |       |
|                                                           |   | pied plein ..... ( 5 à 15)             | <i>sanguifluus</i>  | N° 26 |
| 2. Lait blanc, devenant rouge-rosé à l'air .....          |   | ( 6 à 9)                               | <i>acris</i>        | N° 27 |
| 3. Lait blanc, devenant parfois blanc-crème à l'air ..... |   | (12 à 30)                              | <i>controversus</i> | N° 1  |
| 4. Lait blanc, devenant jaune-soufre à l'air.             |   |                                        |                     |       |
| a)                                                        |   |                                        |                     |       |
| Champignons                                               | { | chair assez épaisse,                   |                     |       |
| inodores                                                  |   | grenue ..... ( 3 à 6)                  | <i>theiogalus</i>   | N° 5  |
|                                                           |   | chair mince, spongieuse ..... ( 2 à 5) | <i>tabidus</i>      | N° 6  |
| b) Champignons à odeur fétide, s'atténuant .....          |   | ( 6 à 8)                               | <i>quictus</i>      | N° 7  |
| 5. Lait blanc, devenant gris-sale à l'air .....           |   | ( 4 à 8)                               | <i>musteus</i>      | N° 28 |
| 6. Lait blanc, et restant blanc à l'air.                  |   |                                        |                     |       |
| Chapeau visqueux ou humide-lubrifié                       |   | (6 à 12)                               | <i>pallidus</i>     | N° 23 |
| Chapeau                                                   | { | ocracé-rosé. .... ( 5 à 10)            | <i>helvus</i>       | N° 14 |
| tomenteux                                                 |   | orangé-clair ..... ( 2 à 5)            | <i>subalpinus</i>   | N° 24 |

CINQUIÈME GROUPE

LACTAIRES A CHAPEAU GRIS, OU GRISATRE

A. — Chapeau visqueux, ou humide-lubrifié.

- |                                                    |   |                             |                   |       |
|----------------------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------|
| 1. Lait blanc, devenant rouge-rosé à l'air .....   |   | ( 6 à 9)                    | <i>acris</i>      | N° 27 |
| 2. Lait blanc, devenant violet à l'air             | { | chapeau zoné..... ( 6 à 12) | <i>violascens</i> | N° 29 |
|                                                    |   | chapeau non zoné.. ( 6 à 8) | <i>uvividus</i>   | N° 30 |
| 3. Lait blanc, devenant crème-citrin à l'air ..... |   | ( 8 à 12)                   | <i>trivialis</i>  | N° 31 |

|                                         |   |                                                     |                    |       |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 4. Lait blanc, devenant gris à l'air    | { | pied visqueux . . . . ( 4 à 8)                      | <i>blennius</i>    | N° 32 |
|                                         |   | pied sec . . . . . ( 3 à 5)                         | <i>vietus</i>      | N° 33 |
| 5. Lait blanc, et restant blanc à l'air | { | chapeau gris - livide,                              |                    |       |
|                                         |   | ou gris-olivacé . . . ( 5 à 9)                      | <i>pyrogalus</i>   | N° 34 |
|                                         |   | chapeau gris-roux, ou gris-brun . . . . . ( 8 à 12) | <i>circellatus</i> | N° 35 |

**B. — Chapeau sec, tomenteux ou velouté, non visqueux.**

|                                                         |          |                                       |           |                  |       |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 1) Champignon à odeur de Cannelle ou de Bergamote. .... | ( 2 à 6) | <i>glycyomus</i>                      | N° 36     |                  |       |
| 2) Champignons inodores                                 | {        | chapeau gris-sale, très petit .....   | ( 2 à 3)  | <i>griseus</i>   | N° 37 |
|                                                         |          | chapeau gris-jaunâtre, mamelonné ..   | ( 3 à 6)  | <i>mammosus</i>  | N° 38 |
|                                                         |          | chapeau gris - de - plomb-lilacé .... | ( 5 à 15) | <i>flexuosus</i> | N° 39 |
|                                                         |          |                                       |           |                  |       |

**SIXIÈME GROUPE**

**LACTAIRES A CHAPEAU BRUN, OU BRUNATRE**

**A. — Lait âcre et brûlant.**

|                                                                        |                    |       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1) Chapeau visqueux, ou humide-lubrifié. . . . . ( 8 à 12)             | <i>circellatus</i> | N° 35 |
| 2) Chapeau non visqueux, sec, pubescent, puis lisse . . . . . ( 6 à 9) | <i>rufus</i>       | N° 40 |

**B. — Lait doux, ou d'abord doux, puis âcre.**

|                                                                       |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1) Grosse espèce à chapeau nankin, ou brun-safrané. . . . . (10 à 12) | <i>volemus</i> | N° 41 |
| 2) Espèces dont le chapeau n'atteint pas 10 $\frac{c}{m}$             |                |       |

|                            |   |                            |           |                     |       |
|----------------------------|---|----------------------------|-----------|---------------------|-------|
| a) Champignons<br>inodores | { | chapeau fauve-incar-       |           |                     |       |
|                            |   | nat, à centre ver-         |           |                     |       |
|                            |   | dâtre . . . . .            | ( 1 à 2 ) | <i>cyathula</i>     | N° 15 |
|                            |   | chapeau cannelle-bri-      |           |                     |       |
|                            |   | queté; lisse . . . . .     | ( 3 à 8 ) | <i>subdulcis</i>    | N° 12 |
| b) Champignons<br>odorants | { | chapeau brun - bri-        |           |                     |       |
|                            |   | queté-fauve . . . . .      | ( 3 à 6 ) | <i>mitissimus</i>   | N° 42 |
|                            |   | chapeau-brun enfumé-       |           |                     |       |
|                            |   | bistré . . . . .           | ( 2 à 6 ) | <i>obnubilus</i>    | N° 43 |
|                            |   | Lait chapeau brun-rouge-   |           |                     |       |
|                            | { | blanc briqueté ..          | ( 4 à 6 ) | <i>camphoratus</i>  | N° 13 |
|                            |   | et chapeau brun-fauve.     |           |                     |       |
|                            |   | séreux ( 3 à 4 )           |           | <i>serifluus</i>    | N° 44 |
|                            |   | Lait chapeau incarnat-bri- |           |                     |       |
|                            |   | blanc queté. . . . .       | ( 6 à 8 ) | <i>quietus</i>      | N° 7  |
|                            | { | crème chapeau briqueté-    |           |                     |       |
|                            |   | jaunis-roux-cendré         | ( 2 à 5 ) | <i>subumbonatus</i> | N° 45 |
|                            |   | sant                       |           |                     |       |

## SEPTIÈME GROUPE

## LACTAIRES A CHAPEAU NOIRATRE

|                                        |   |                        |            |                    |       |
|----------------------------------------|---|------------------------|------------|--------------------|-------|
| A. — Chapeau à bords garnis de longs   |   |                        |            |                    |       |
| poils laineux . . . . .                |   |                        | (10 à 30)  | <i>plumbeus</i>    | N° 46 |
| B. — Chapeau à bords non garnis de     |   |                        |            |                    |       |
| poils laineux . . . . .                |   |                        |            |                    |       |
| a)                                     |   |                        |            |                    |       |
| Lait et chair<br>rougissant<br>à l'air | { | pied cannelé au som-   |            |                    |       |
|                                        |   | met. . . . .           | ( 6 à 10 ) | <i>lignyotus</i>   | N° 47 |
|                                        |   | pied chapeau bis -     |            |                    |       |
|                                        |   | non tre-noir. . . . .  | ( 4 à 8 )  | <i>picinus</i>     | N° 48 |
|                                        |   | can- chapeau ocracé-   |            |                    |       |
| b) Lait restant                        | { | nelé enfumé. . . . .   | ( 3 à 10 ) | <i>fuliginosus</i> | N° 49 |
|                                        |   | blanc à l'air. . . . . | ( 5 à 8 )  | <i>umbrinus</i>    | N° 50 |

# RÉSUMÉ

## DE LA TROISIÈME CLASSIFICATION

---

### LACTAIRES A LAIT ROUGE

|                                                                        |           |                    |       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| A. — Chapeau orangé-clair; lait orangé-vif ;<br>pied creux .....       | ( 5 à 15) | <i>deliciosus</i>  | N° 25 |
| B. — Chapeau incarnat-orangé; lait rouge-<br>violacé; pied plein ..... | ( 5 à 15) | <i>sanguifluus</i> | N° 26 |

### LACTAIRES A LAIT BLANC, DEVENANT ROUGE A L'AIR

|              |                                              |           |                    |       |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| A. — Chapeau | { chapeau visqueux ..                        | ( 6 à 9)  | <i>acris</i>       | N° 27 |
| grisâtre     | { chapeau sec, tomen-<br>teux-floconneux ... | ( 3 à 16) | <i>fuliginosus</i> | N° 49 |
| B. — Chapeau | { pied cannelé au som-<br>met .....          | ( 6 à 10) | <i>lignyotus</i>   | N° 47 |
| noirâtre     | { pied non cannelé ...                       | ( 4 à 8)  | <i>picinus</i>     | N° 48 |

### LACTAIRES A LAIT BLANC, DEVENANT VIOLET A L'AIR

|                                                       |                                  |                        |       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------|
| A. — Chapeau à bords garnis de poils<br>laineux ..... | ( 9 à 16)                        | <i>repraesentaneus</i> | N° 19 |
| B. — Chapeau sans poils laineux.                      |                                  |                        |       |
| 1. Chapeau non zoné.....                              | ( 6 à 8)                         | <i>uvividus</i>        | N° 30 |
| 2. Chapeau                                            | { chapeau gris-violacé ( 6 à 12) | <i>violascens</i>      | N° 29 |
| zoné                                                  | { chapeau jaune-paille ( 6 à 9)  | <i>aspideus</i>        | N° 20 |

### LACTAIRES A LAIT BLANC, DEVENANT JAUNE A L'AIR

|                                                       |           |                      |       |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------|
| A. — Chapeau à bords garnis de poils<br>laineux ..... | (10 à 15) | <i>scrobiculatus</i> | N° 18 |
| B. — Chapeau sans poils laineux.                      |           |                      |       |

|                                 |   |              |   |                                          |                     |       |
|---------------------------------|---|--------------|---|------------------------------------------|---------------------|-------|
| 1) Chapeau visqueux             | { | chapeau zoné | { | chapeau blanchâtre, zoné de rose...      | <i>controversus</i> | N° 1  |
|                                 |   |              |   | (12 à 30)                                |                     |       |
|                                 |   |              |   | chapeau incarnat, zoné d'orange...       |                     |       |
|                                 |   |              |   | (5 à 8)                                  |                     |       |
| 2) Chapeau glabre, non visqueux | { | {            | { | chapeau non zoné; gris-lilacin, (8 à 12) | <i>chrysorheus</i>  | N° 4  |
|                                 |   |              |   | chair épaisse et grenue( 3 à 6)          | <i>trivialis</i>    | N° 31 |
|                                 |   |              |   | chair mince et spongieuse.....( 2 à 5)   | <i>theiogalus</i>   | N° 5  |
|                                 |   |              |   |                                          | <i>tabidus</i>      | N° 6  |

### LACTAIRES A LAIT BLANC, DEVENANT GRIS A L'AIR

|                                  |   |                     |          |                 |       |
|----------------------------------|---|---------------------|----------|-----------------|-------|
| Chapeau gris                     | { | pied visqueux ..... | ( 4 à 8) | <i>bleunius</i> | N° 32 |
| ou grisâtre                      | { | pied sec.....       | ( 3 à 5) | <i>vrietus</i>  | N° 33 |
| Chapeau chamois-blanchâtre ..... |   |                     | ( 4 à 8) | <i>musteus</i>  | N° 28 |

## UN CURIEUX CHAMPIGNON

---

Depuis plusieurs années, pousse à Bar-le-Duc, boulevard de la Rochelle, un champignon appartenant au genre *Chitonia* et qui diffère assez du *Chitonia Pequinii* décrit par Boudier, pour constituer une espèce nouvelle.

Le genre *Chitonia* comprend des champignons à spores pourpres et à pied muni d'une volve.

La végétation de la nouvelle espèce est assez exceptionnelle pour causer des soucis au service municipal de la voirie de Bar-le-Duc, qui doit, chaque année, procéder à la réfection du trottoir crevassé par le *Chitonia* assez fort pour soulever de larges plaques d'asphalte.

Les premiers exemplaires ont été apportés à la Société par M. Pierre Brichard, en 1929.

L'année suivante d'autres exemplaires furent cueillis le 5 juillet et le 13 août, en vue d'études histologiques ; malheureusement celles-ci ne purent pas être entreprises à cette époque.

Cette année, des circonstances favorables se sont présentées. M. Martin, professeur au Lycée de Bar-le-Duc a pu cueillir quelques échantillons le 29 avril dernier, et M. Pierre Brichard a réussi à en avoir d'autres le 22 juin.

Les échantillons apportés par M. Brichard ont été préparés et feront l'objet d'une étude détaillée qui paraîtra dans le prochain Bulletin avec une planche en couleurs.

En attendant, voici quelques observations faites par M. Martin.

### LE CHITONIA

C'est un champignon bien curieux et surtout bien fantaisiste que le *Chitonia* décrit par Péquin, pour la première fois, je crois, et voici ce qu'il en dit :

Chapeau blanc ou blanc-cendré, 10 cm. de diamètre, déprimé au centre, couvert d'écailles brunes qui s'unissent en une volve épaisse, fendue circulairement autour du chapeau et d'autre part entourant la base du pied jusqu'à moitié de sa hauteur et denticulée en haut ; bords du chapeau à stries très serrées ; pied court, épais, fusiforme ; lamelles brun-pourpre ; chair blanche rougissant quand on la coupe ou la froisse.

Les exemplaires que j'ai trouvés sous le bitume du boulevard de la Rochelle, à Bar-le-Duc, sont très trapus. Le chapeau a quelques taches jaunes-verdâtres ; la base du pied est très fusiforme, l'extrémité en étant très pointue et surmontée d'un renflement caractéristique.

Je n'ai rencontré ce *Chitonia* que sous le bitume des trottoirs et c'est la raison pour laquelle il est très difficile d'obtenir des échantillons jeunes.

On ne peut en effet les situer que lorsqu'ils ont suffisamment démolì l'asphalte et le bétonnage et cela sur une surface d'environ 0 m. 80.

Lorsqu'une soufflure du trottoir, presque toujours en bordure des maisons se produit, on serait sûrement mal reçu par les propriétaires si on allait, pic en main, démolir, ou plutôt achever de démolir le bitume municipal ; ce sont donc les *Chitonias* qui ont l'avant-dernier mot.

Ces champignons sont comestibles ; la chair, un peu acidulée, est très savoureuse ; mais c'est une hérésie, un crime mycologique, de détruire une espèce aussi rare.

René MARTIN,  
*Secrétaire de la Section Mycologique  
de Bar-le-Duc.*

---

## COMPTE-RENDU FINANCIER

---

Le bilan exposé dans le dernier Bulletin (n° 11-1934) montrait que l'avoir de la Société se montait à la somme de 9.643 fr. 75.

Pendant les années 1933, 1934 et 1935, les opérations de la Caisse de la Société ont été les suivantes :

### RECETTES

#### 1933

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 250 cotisations à 10 francs..... | 2.500 » |
|----------------------------------|---------|

#### 1934

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 260 cotisations à 10 francs..... | 2.600 » |
|----------------------------------|---------|

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Subvention de l'Association des Anciens<br>Etudiants de la Faculté de Pharmacie. | 300 » |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|

#### 1935

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 241 cotisations à 10 francs..... | 2.410 » |
|----------------------------------|---------|

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Subvention de l'Association des Anciens<br>Etudiants de la Faculté de Pharmacie. | 300 » |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|

---

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| TOTAL des recettes..... | 8.110 » |
|-------------------------|---------|

### DÉPENSES

#### 1933

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Timbres d'envoi bordereaux..... | 192 50 |
|---------------------------------|--------|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Frais et taxes d'impayés..... | 143 50 |
|-------------------------------|--------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Facture Montigny ..... | 25 » |
|------------------------|------|

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Facture Imprimerie Nancéienne. .... | 119 75 |
|-------------------------------------|--------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Frais d'exposition ..... | 50 » |
|--------------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Frais de bureau. .... | 50 » |
|-----------------------|------|

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Achat d'enveloppes et bordereau..... | 10 » |
|--------------------------------------|------|

---

|             |        |
|-------------|--------|
| TOTAL. .... | 590 75 |
|-------------|--------|

1934

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Timbres pour Bulletin n° 11.....   | 95 »            |
| Timbres pour envoi bordereaux..... | 205 25          |
| Frais et taxes d'impayés.....      | 160 15          |
| Facture Dory .....                 | 1.370 80        |
| Facture Montigny .....             | 20 »            |
| Frais d'exposition .....           | 50 »            |
| Frais de bureau. ....              | 50 »            |
| <b>TOTAL. ....</b>                 | <b>1.951 20</b> |

1935

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Timbres pour envoi Bolets.....     | 117 »           |
| Timbres pour envoi bordereaux..... | 180 25          |
| Frais et taxes d'impayés.....      | 158 75          |
| Facture Arts Graphiques. ....      | 1.989 15        |
| Facture Montigny .....             | 35 50           |
| Frais d'exposition .....           | 170 »           |
| Frais de bureau. ....              | 150 »           |
| <b>TOTAL. ....</b>                 | <b>2.708 65</b> |

**TOTAL DES DÉPENSES ..... 5.250 60**

**Excédent des recettes : 8.110 — 5.250,60 = 2.859 40**

BILAN

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Avoir au 31 décembre 1932.....                  | 9.643 75         |
| Excédent des recettes 1933-35.....              | 2.859 40         |
| <b>AVOIR de la Société au 31 décembre 1935.</b> | <b>12.503 15</b> |

*Le Trésorier : M. LEBLANC.*





En Vente à la Librairie

**DORY**

Téléphone 23.15

24, Rue Saint-Jean, NANCY

**P. Seyot.** — Les Amanites et la Tribu des Amanitées.

**P. Seyot.** — A. B. C. Mycologique.

**Memento Agricole** (Larousse (1 vol.).

**Le Cerf.** Cent Champignons reproduits en couleurs.

**Bernardin.** — 60 champignons comestibles et vénéneux, 1 vol. relié.

**Gueguen.** — Champignons mortels et dangereux (Larousse).

**Bonnier et G. Layens.** — Nouvelle flore pour la détermination facile des plantes  
2.173 fig.

**Bonnier.** — Nom des Fleurs.

**Bonnier.** — Flore complète, illustrée en couleurs.

**Godron.** — Flore de la Lorraine, 2 vol. brochés.

**Fabre.** — Le livre des Champs sur les choses de l'Agriculture, illustré de 100 grav.  
dans le texte et 12 photos hors texte.

**Larousse** (Agricole illustré), en 2 volumes, sous la direction de E. Chancrin, Inspecteur général de l'Agriculture, et R. Dumont, professeur d'Agriculture.

**Larousse.** (Histoire naturelle) illustrée en 2 volumes. — 1<sup>er</sup> vol. : *Les Plantes*, par J. Costantin et F. Faideau ; 2<sup>e</sup> vol. : *Les Animaux*, par J. Joubin et Aug. Robin.

**Larousse.** — La Chasse moderne, Encyclopédie du Chasseur.

id. La Pêche moderne, Encyclopédie du Pêcheur.

id. Ménager, 1 vol.

id. Médical, 1 vol.

id. Commercial, 1 vol.

**Clerc Rampal.** — La Mer, 1 vol.

**Hachette.** — Omnium agricole, 1 vol. relié.